

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و ضد رادیکالی عصاره مтанولی دو واریته بلوط و تعیین نوع ترکیبات فنولی با کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا

مریم قادری قهرخی^{*} - علیرضا صادقی ماهونک^۲ - مرتضی خمیری^۳ - راحیل رضائی^۰

تاریخ دریافت: ۸۹/۹/۸

تاریخ پذیرش: ۹۰/۵/۳

چکیده

در این پژوهش میزان ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی و فعالیت ضد رادیکالی و ضد میکروبی عصاره مтанولی میوه دو واریته بلوط ایرانی به نام-های *Quercus.castaneifolia var castaneifolia* و *Quercus.branti var persica* مورد بررسی قرار گرفت. مقدار ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و بازدهی استخراج عصاره مтанولی واریته کاستانیفولیا (MC) به طور معنی‌داری بیشتر از واریته پرسیکا (MP) بود. فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ها با آزمون مهار رادیکال‌های آزاد DPPH مورد بررسی قرار گرفت و با آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی BHT و BHA مقایسه شد. مقادیر ۵۰ EC برای MC، MP و BHA به ترتیب ۴۲/۸۴، ۷۰/۴۰ و ۴۱/۷۳ میکروگرم در میلی لیتر بود. عصاره‌ها فعالیت ضد میکروبی قابل ملاحظه‌ای در مقابل تمامی باکتری‌های مورد بررسی نشان دادند و تاثیر عصاره‌ها بر باکتری‌های گرم مثبت بیشتر از باکتری‌های گرم منفی بود. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره‌های MP و MC به ترتیب از ۱/۲۵-۵ و ۰/۳۱۲-۵ میلی گرم در میلی لیتر متغیر بود. از نظر کمترین غلظت مهار کنندگی، برای باکتری‌های سالمونلا تیفی و شیگلا دیسانتری اختلافی بین دو عصاره مشاهده نشد، اما بررسینیا انتروکولیتیکا و اشرشیاکلی در غلظت‌های پائین-تری از عصاره MC مهار شدند. به استثنای سیتروباکتر فرونوندی، عصاره MP در غلظت ۵ mg/ml تمام باکتری‌های گرم منفی اثر بازدارندگی داشت. بیشترین اثر باکتری کشی عصاره MC مربوط به باسیلوس سرئوس (MBC=۰/۳۱۲ mg/ml) بود در حالی که شیگلا دیسانتری بیشترین میزان (۱۰ mg/ml) را دارد. شناسایی ترکیبات فنولی عصاره‌ها با کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا حاکی از وجود اسیدهای گالیک، کلروژنیک، کافئیک و p-کوماریک در عصاره‌ی MC و اسیدهای گالیک، کلروژنیک و کافئیک و سیرینجیک در عصاره‌ی MP بود.

واژه‌های کلیدی: ترکیبات فنولی، عصاره مтанولی، فعالیت ضد میکروبی، اسید گالیک، میوه بلوط

عملکردهای مفید آنتی اکسیدان‌ها به شمار می‌آیند (Moure et al, 2001). کاربرد آنتی اکسیدان‌های سنتزی نظیر بوتیلات هیدروکسی آنیزول (BHA)، بوتیلات هیدروکسی تولوئن (BHT) و پروپیل گالات در حین فرآوری مواد غذایی منجر به بروز آثار جانبی نامطلوبی می‌گردد که از آن جمله می‌توان به سلطان زائی و بزرگ شدن کبد اشاره کرد. در نتیجه این محدودیتها امروزه یافتن آنتی اکسیدان‌های طبیعی که قادر به مهار واکنش‌های زنجیری رادیکال‌های آزاد، کند کردن روند تند شدن اکسیداتیو روغن‌ها و محافظت از بدن انسان در مقابل بیماری‌ها می‌گردد، از اهمیت زیادی برخوردار است (Ebrahimabadi et al, 2010).

آلودگی میکروبی یکی دیگر از مشکلاتی است که صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و داروئی با آن رو به رو می‌باشند. یکی از نگرانی-

مقدمه

آنتی اکسیدان‌ها نقش مهمی در مهار رادیکال‌های آزاد و شکستن واکنش‌های زنجیری اکسیداسیون دارند. مهار واکنش‌های اکسیداسیون در مواد غذایی، داروئی، آرایشی و بهداشتی و جلوگیری از بروز بیماری‌های مرتبط به استرس‌های اکسیداتیو، برخی از

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

۲- نویسنده مسئول: (Email: mghaderi_gh@yahoo.com)
استادیاران دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

۳- دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

۴- دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

مواد غذایی صورت گرفته است. از آنجایی که بیشتر بررسی‌های انجام شده در این زمینه روی برگ، پوسته داخلی و پوسته تنه درخت بلوط صورت گرفته، لذا هدف از این تحقیق، بررسی خواص ضد رادیکالی، ضد میکروبی و تعیین ترکیبات فنولی عصاره مтанولی میوه دو واریته بلוט ایرانی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

تهیه عصاره

در این تحقیق از میوهی بلוט دو واریته‌ی بلוט استفاده شد. واریته‌ی *Quercus.branti var persica* از جنگل‌های بلוט استان *castaneifolia* var چهارمحال و بختیاری و واریته‌ی *Quercus castaneifolia* از جنگل قرق واقع در شرق شهرستان گرگان جمع آوری گردیدند. پس از خشک کردن میوه‌ها در دمای محیط و جدا کردن پوسته‌های چوبی و داخلی، توسط آسیاب چکشی (ایران خودساز) به صورت آرد (تا مش ۶۰) در آمدند. جهت تهیه عصاره فنولی از حلال مтанول ۸۰٪ (حجمی: حجمی) استفاده شد. ۱۰۰ میلی‌لیتر حلال به ۱۰ گرم پودرافزوود و مخلوط حاصله به مدت ۴ ساعت در دمای محیط با همزن مغناطیسی هم زده شد. پس از این مرحله، بخش جامد به وسیله کاغذ صافی معمولی جدا گردید و عمل استخراج با حلال تازه مانند قبل تکرار گردید. عصاره‌های حاصل از دو مرحله با یکدیگر ادغام گردیدند و به وسیله تبخیر کننده چرخان (مدل Laborata4000 Operun- FDB550) ساخت کمپانی هایدولف) در دمای ۴۰°C تقلیض و در نهایت عصاره‌ها توسط خشک کن انجامدادی (Slinkard & Singelton, 1977) ساخت کرده جنوبی در دمای ۵۰°C به پودر تبدیل شدند و تا زمان استفاده در ظروف غیر قابل نفوذ به هوا در فریزر -۱۸°C قرار گرفتند. (Liu & Yao, 2007). جهت سهولت در بیان نتایج، عصاره مтанولی واریته کاستانیفولیا و پرسیکا به ترتیب با علانئ MC و MP بیان می‌شوند. تمامی مواد مورد استفاده در این پژوهش با درجه خلوص بالا و از شرکت‌های مرک و سیگما تهیه شدند.

اندازه گیری میزان ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی

مقدار کل ترکیبات فنولی با روش فولین سیوکالنه (Slinkard & Singelton, 1977) (اندازه گیری شد. جهت تعیین میزان ترکیبات فلاونوئیدی نیز از روش چانگ و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شد.

میزان به دام اندازی رادیکال‌های آزاد ^۱ DPPH

برای این منظور، محلول‌هایی با غلظت‌های مختلف از عصاره‌ها و

های تولید کنندگان و نیز محققین صنعت غذا، افزایش رو به رشد بیماری‌های مرتبط با مصرف مواد غذایی است که توسط پاتوژن‌ها یا آنتروتوکسین‌های آنها ایجاد می‌گردد. گونه‌های مختلف اشرشیاکلی، استافیلکوکوس، سالمونلا، یرسینیا و کلستریدیوم منجر به بروز برخی بی‌نظمی‌های معدی- رودی نظیر اسهال و استفراغ می‌گردد. علاوه بر این، برخی از این میکروارگانیسم‌ها با فساد مواد غذایی و به تبع آن با زیان‌های اقتصادی مرتبط می‌باشند (Demirsi et al, 2008).

افزایش استفاده از آنتی بیوتیک‌ها منجر به افزایش مقاومت میکروارگانیسم‌ها به این ترکیبات شده است و پذیرش کلی مصرف کنندگان را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین امروزه جست و جو برای انواع جدیدی از آنتی بیوتیک‌های موثر و غیر سمجی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات زیادی در زمینه یافتن عوامل ضد میکروبی به ویژه ترکیبات آنتی میکروبی طبیعی در دهه گذشته انجام شده است و در این راستا گیاهان و محصولات گیاهی نظیر انسان‌ها و عصاره‌ها بسیار مورد مطالعه قرار گرفته اند (Burt, 2004). ترکیبات فنولی دسته بزرگی از متابولیت‌های ثانویه گیاهی می‌باشند که در سال‌های اخیر به دلیل عملکردهای بیولوژیکی متنوع مورد توجه قرار گرفته اند. فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی به اثبات رسیده است. مکانیسم‌هایی که به واسطه آن ترکیبات فنولی برای میکروارگانیسم‌ها سمتی ایجاد می‌کنند شامل جذب سطحی و شکستن غشاء سلول، واکنش با آنزیم‌ها و کاهش یون‌های فلزی مورد نیاز باکتری‌ها می‌باشد. بنابراین استفاده از ترکیبات فنولی در مواد غذایی نه تنها منجر به محافظت از مواد غذایی می‌گردد و زمان ماندگاری آنها را افزایش می‌دهد بلکه با افزایش ثبات اکسیداتیو مواد غذایی حاوی چربی همراه بوده و بیماری‌های مرتبط با منابع میکروبی را نیز به خوبی کنترل می‌نماید (Majhenic et al, 2007).

درخت بلوط متعلق به خانواده فاگاسه و جنس کوئرکوس می‌باشد. میوه‌ی این درخت یکی از منابع غنی از کربوهیدرات، اسید آمینه، چربی و استرول‌های مختلف بوده که از قدیم الایام در بسیاری از مناطق جهان در تهیه‌ی نان یا کیک مورد استفاده قرار گرفته است. میوه‌ی بلوط علاوه بر ترکیبات تغذیه‌ای حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فعال بیولوژیکی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به تانن، گالیک اسید، الاجیک اسید و مشتقات گالولیل یا هنگزا هیدروکسی دی فنوئیل اشاره کرد که تمامی این ترکیبات دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند (Rakic et al, 2007). در منابع علمی خواص درمانی بسیاری برای قسمت‌های مختلف درخت بلوط نظیر برگ، پوست ساقه‌های جوان، پوست تنه و گل‌های آن اشاره شده است که از آن جمله می‌توان به خواص ضد عفونی کنندگی میوه بلوط اشاره کرد (حاجی شریفی، ۱۳۸۲). علی رغم پوشش انبوه جنگل‌های بلوط در مناطق مختلف کشور، مطالعات اندکی در زمینه فعالیت ضد میکروبی عصاره‌های مختلف میوه این درخت به ویژه علیه باکتری‌های عامل فساد

صفی ۲۰ میکرولیتر به دستگاه تزریق گردید (Arabshahi, 2006).

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره‌ها

تهیه سویه‌های میکروبی

میکروارگانیسم‌های مورد بررسی در این مطالعه شامل باکتری‌های گرم مثبت شامل باسیلوس سرئوس (PTCC 1015)، استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 1885)، میکروکوکوس لوتوسوس (ATCC 7984) و باکتری‌های گرم منفی شامل اشرشیاکلی (ATCC 1639)، سالمونلا تیفی موریوم (PTCC 1151)، شیگلا دیسانتری (PTCC 1188)، برسینیا انتروکولیتیکا (PTCC 24580) بودند. سویه‌های خالص این باکتری‌ها از مرکز کلکسیون قارچ‌ها و باکتری‌های صنعتی ایران خریداری شد.

تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC)^۴

حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره‌های مтанولی دو واریته با استفاده از روش رقت سازی در چاهک (میکروب‌راحت دایلوشن) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پلیت‌های استریل ۹۶ خانه‌ای استفاده شد. محلول استوک عصاره در دی متیل سولفوكساید تهیه گردید و غلظت‌های مختلف عصاره (از ۴۰ تا ۱/۱۵۶ میلی‌گرم در میلی لیتر) با رقیق سازی محلول استوک با محیط کشت مولر هیبتون براث تهیه شد. باکتری‌ها به مدت یک شبانه روز قبل از انجام آزمایش، در دمای ۳۷°C روی محیط کشت نوترینت آگار کشت داده شدند. جهت تهیه سوسپانسیون میکروبی (۱۰^۶ cfu/ml) از رقت ۰/۵ مک فارلن استفاده شد. بعد از پر کردن چاهک‌ها، میکروپلیت‌ها به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷°C قرار داده شد و بعد از طی این دوره میزان کدورت توسط دستگاه الایزا ریدر (بیوتك اینسترومانت) در طول موج ۶۳۰ نانومتر قرائت شد. اولین خانه‌ای که در آن کدورتی دیده نشد به عنوان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) تعیین شد. آزمایشات در ۳ تکرار و ۳ زمان مختلف انجام شد (NCCLS, 2000).

حداقل غلظت کشندگی (MBC)^۵

از خانه‌هایی که در آنها کدورتی مشاهده نشد، ۵ میکرولیتر به محیط کشت جامد (مولر هیبتون آگار) منتقل و یک شب در دمای ۳۷ درجه نگهداری شد. اولین غلظتی که در آن هیچ رشدی دیده نشد به عنوان حداقل غلظت کشندگی (MBC) می‌باشد (Oroojalian et al., 2010).

نیز آنتی اکسیدان‌های سنتزی بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT) و بوتیل هیدروکسی آنیزول (BHA) در حلال متابول آماده شدند. یک میلی‌لیتر از محلول متابول DPPH (با غلظت ۱ میلی مولار) به ۳ میلی‌لیتر از عصاره افزوده و مخلوط حاصله به شدت هم زده شد. لوله‌های آزمایش به مدت ۳۰ دقیقه در محل تاریک قرار گرفتند. بعد از این مدت میزان جذب در طول موج ۵۱۷ نانومتر قرائت شد. لازم به ذکر است در نمونه کنترل، عصاره با ۳ میلی لیتر متابول جایگزین شد. در نهایت درصد مهار رادیکال‌های DPPH توسط عصاره با فرمول زیر محاسبه گردید.

$$\frac{(A_c - A_s)}{A_c} \times 100 = \text{به دام اندازی رادیکال آزاد (\%)}$$

که در این رابطه A_c و A_s به ترتیب جذب کنترل و جذب نمونه می‌باشند. EC₅₀ به غلظتی از عصاره گفته می‌شود که در آن، ۵۰٪ از رادیکال‌های آزاد موجود در محیط مهار شوند (Yildirim et al., 2001).

تعیین نوع ترکیبات فنولی عصاره‌ها با روش

کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا^۱

به منظور تعیین نوع ترکیبات فنولی موجود در عصاره‌ها از روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا استفاده شد. مشخصات دستگاه به شرح زیر بود:

مدل دستگاه: مرک-هیتاچی ال-۷۱۰۰، دتکتور: دتکتور دیود اری هیتاچی ال-۲۴۵۰، آون ستون: هیتاچی ال-۲۳۰۰ و نوع ستون: آر پی-۱۸ با بعد ۴/۶ × ۲۵۰ میلی‌متر و اندازه‌ی ذرات ۵ میکرو متر.

فاز متحرک مورد استفاده در این بررسی شامل آب دیونیزه: استونیتریل: اسید استیک با نسبت ۱:۱۰:۸۹:۱ (حجمی: حجمی)، سرعت جریان فاز متحرک در ستون ۱ میلی‌لیتر در هر دقیقه، سیستم مورد استفاده ایزو کراتیک^۲ و دمای ستون ۲۵°C بود. جهت شناسائی نوع ترکیبات فنولی از استانداردهای اسید گالیک، اسید فرولیک، اسید کلروزئنیک، اسید کافئیک، اسید سیرینجیک و اسید ۲-کوماریک استفاده شد. برای این منظور حدود ۱۰۰ میلی‌گرم از هر عصاره در ۱۰ میلی‌لیتر متابول ۱۰٪ حل شد و به مدت ۱۰ دقیقه در حمام فراصوت قرار گرفت. سپس محلول‌ها به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۱۰۰۰ سانتیفیوژ شدند. جهت جلوگیری از ورود ناخالصی‌های احتمالی موجود در عصاره‌ها به ستون، محلول‌های عصاره با فیلترهای سرنگی با اندازه‌ی منفذ ۲/۰ میکرومتر صاف و در نهایت از محلول خروجی از

1- High Performance liquid Chromatography

2- Reverse Phase -18

3- Isocratic

نتایج و بحث

مقدار ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و بازدهی استخراج
 مقدار ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و بازدهی استخراج عصاره‌های فنولی دو واریته در جدول ۱ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود اختلاف معنی داری ($P < 0.05$) بین عصاره‌ها از نظر این سه ویژگی وجود دارد. مقدار ترکیبات فنولی کل عصاره MC به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از MP بود.

آنالیز آماری

در این پژوهش تیمارها در سه تکرار انجام شده و نتایج به دست آمده با استفاده از روش آنالیز واریانس (ANOVA) و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ($P < 0.05$) صورت گرفت. آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SAS.9.1 و رسم نمودارها با نرم افزار Excel انجام شد.

جدول ۱- مقدار کل ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی، بازدهی استخراج و غلظت موثره عصاره‌های مтанولی دو واریته بلوط ایرانی

استخراج (%)	بازدهی عصاره	مقدار کل ترکیبات فلاونوئیدی (میکروگرم کوئرسيتین اگرم عصاره)	مقدار کل ترکیبات فنولی (میلی گرم گالیک اسید/گرم عصاره)	واریته
۳۴/۷۸ ^a		۱۵۰/۳۱ ^a ± ۵/۶۵	۳۱۳/۶۹ ^a ± ۷/۶۳	کاستانیفولیا
۲۸/۹ ^b		۱۲۶/۸ ^b ± ۸/۶۷	۲۸۱/۵۵ ^b ± ۸/۳۵	پرسپیکا

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین دو واریته در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد.

ترکیبات فلاونوئیدی دو واریته بلوط از ۱۲۶/۸ برای MP تا ۱۵۰/۳۱ میکروگرم معادل کوئرسيتین در هر گرم عصاره متغیر بود. واریته‌های مورد استفاده در این بررسی، تاثیر معنی داری ($P < 0.05$) بر میزان بازدهی استخراج و احتمالاً نوع ترکیبات استخراج شده داشته اند. آنالیز همبستگی بین مقدار ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی انجام شد. نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت بالاتر بین مقدار این ترکیبات در دو عصاره بود ($P < 0.01$, $R^2 = 0.93$). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ها احتمالاً مربوط به ترکیبات فلاونوئیدی آنها خواهد بود. همبستگی بالاتر بین مقدار ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی میوه‌های آناناس و موز گزارش شد که با نتایج به دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد (Alothman et al, 2009).

به دام اندازی رادیکال‌های آزاد DPPH


اندازه‌گیری میزان مهار رادیکال‌های آزاد DPPH یکی از روش‌های معتبر، دقیق، آسان و مقوون به صرفه با قابلیت تکرار پذیری بالا می‌باشد که در بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌های گیاهی در شرایط آزمایش‌گاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد (Singh & Singh, 2008). DPPH یکی از رادیکال‌های هیدروفلیک و پایدار با رنگ بنفش تیره بوده که حداقل جذب آن در محدوده ۵۱۵ تا ۵۱۷ نانومتر است. هنگام دریافت الکترون از ترکیبات احیاء کننده نظیر فنول‌ها، این رادیکال به فرم هیدرازین بی رنگ تبدیل می‌شود که این تغییر ساختاری با کاهش میزان جذب همراه است (Zhou & Yo, 2004).

عوامل متعددی مقدار ترکیبات فنولی موجود در بافت‌های گیاهی را تحت تاثیر قرار می‌دهند که از آن جمله می‌توان به فاکتورهای ژنتیکی، میزان تابش نور خورشید، شرایط خاک، درجه رسیدگی در زمان برداشت، شرایط محیطی و آب و هوایی، عملیات پس از برداشت و شرایط نگهداری اشاره کرد (Faller & Fialho, 2009). مقدار ترکیبات فنولی کل و تانن عصاره مtanولی میوه بلوط گونه کوئرکوس روبور به ترتیب ۰/۲۲۳ و ۰/۰۴ و برای گونه کوئرکوس سوبور ۰/۰۱۸ و ۰/۰۲۲۹ میلی‌گرم معادل اسید گالیک در میلی‌گرم عصاره بود (Racik et al, 2007). مقادیر گزارش شده برای ترکیبات فنولی این گونه‌ها نسبت به دو واریته موربد برسی در این تحقیق حاضر کمتر بود. ترکیبات فنولی ۴ واریته مختلف سیب زمینی به وسیله حلال مtanول استخراج و مقدار ترکیبات فنولی در واریته‌های بنگوتا، ایگورتا، کانزا و ۱۲۵۴۱۱.۲۲ به ترتیب ۵۰، ۴۷/۴، ۳۹/۱ و ۳۴/۴٪ گزارش شد. تفاوت‌های مشاهده شده بین واریته‌های مختلف سیب زمینی به تفاوت در فاکتورهای ژنتیکی و شرایط محیطی نظیر دسترسی به آب، نور و دما نسبت داده شد (Rumbaoa et al, 2009). اختلاف بین مقدار ترکیبات فنولی عصاره‌های حاصل از واریته‌های مختلف را می‌توان به تفاوت در نوع ترکیبات فنولی دو واریته، درجه پلیمریزاسیون آنها، حلالیت فنول‌ها و واکنش آنها با دیگر اجزای موجود در ماتریکس غذائی نسبت داد (Thoo et al, 2010). فلاونوئیدها یکی از گسترده‌ترین و متنوع ترین گروه از ترکیبات فیتوشیمیائی گیاهی می‌باشد. این ترکیبات از طیف وسیعی از فعالیتهای فیتوشیمیائی و بیولوژیکی برخوردارند که از آن جمله می‌توان به ویژگی‌های مهار رادیکال‌های آزاد اشاره کرد (Prasad et al, 2009).

با در نظر گرفتن معادله خط استاندارد کوئرسيتین ($R^2 = 0.998$), مقدار

هیدروژن به رادیکال‌های آزاد و به دنبال آن قدرت مهار کنندگی عصاره افزایش می‌یابد (Sanchez-Moreno et al, 1999). قدرت مهار کنندگی عصاره‌های مختلف به میزان زیادی به تعداد و موقعیت گروه‌های هیدروکسیل و وزن مولکولی ترکیبات فنولی بستگی دارد. در ترکیبات فنولی با وزن مولکولی پائین‌تر گروه‌های هیدروکسیل راحت‌تر در دسترس قرار می‌گیرند (Jung et al, 2006). معمولاً برای مقایسه فعالیت ضد رادیکالی عصاره‌های مختلف از فاکتوری تحت عنوان EC₅₀ استفاده می‌شود. طبق تعریف EC₅₀ به غلظتی از عصاره اطلاق می‌گردد که در آن ۵۰٪ از رادیکال‌های آزاد DPPH موجود در محیط واکنش مهار شوند. بنابراین هر چه این غلظت کمتر باشد، نشان دهنده این است که عصاره مورد نظر فعالیت ضد رادیکالی بیشتری دارد. در این بررسی نیز مقادیر EC₅₀ برای تمامی عصاره‌های تعیین و با آنتی اکسیدان‌های سنتزی BHA و BHT مقایسه گردید (جدول ۲). همانطور که در جدول دیده می‌شود، کمترین میزان EC₅₀ متعلق به BHT بود که از این نظر اختلاف معنی‌داری (P<0.05) با عصاره MC نداشت. همچنین اختلاف معنی‌داری بین EC₅₀ عصاره MP و BHA دیده شد و این عصاره از نظر میزان مهار رادیکال‌های آزاد نسبت به BHA قوی‌تر بود.

ترین مکانیسم‌هایی است که به واسطه آن ترکیبات آنتی اکسیدانی می‌توانند اکسیداسیون چربی‌ها را مهار نمایند. نتایج آنالیز واریانس نشان داد، نوع و غلظت عصاره‌ها و آنتی اکسیدان‌های سنتزی تاثیر معنی‌داری بر میزان مهار رادیکال‌های آزاد داشتند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که توانایی عصاره‌ها در مهار رادیکال‌های آزاد وابسته به غلظت بوده و با افزایش غلظت فعالیت ضد رادیکالی آنها افزایش می‌یابد. شکل ۱ میزان مهار رادیکال‌های آزاد توسط غلظت‌های مختلف عصاره‌های متابولی دو واریته و آنتی اکسیدان‌های سنتزی را نشان می‌دهد. در تمامی غلظت‌های مورد بررسی اختلاف معنی‌داری بین BHT و MC مشاهده نشد. اگرچه بین میزان مهار رادیکال‌های آزاد عصاره MP و BHA در غلظت‌های کمتر از ۲۵ میکروگرم در میلی لیتر اختلاف چشم‌گیری مشاهده نشد، اما با افزایش غلظت این ویژگی برای عصاره MP به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت به طوری که در غلظت ۲۰۰ میکروگرم در میلی لیتر از این نظر با BHT نیز قابل رقابت بود. در کل افزایش غلظت ترکیبات فنولی به طور مستقیم میزان توانایی عصاره‌های مختلف را در مهار رادیکال‌های آزاد افزایش می‌دهد. در غلظت‌های بالاتر ترکیبات فنولی به دلیل افزایش تعداد گروه‌های هیدروکسیل موجود در محیط واکنش، احتمال اهداء



شکل ۱- مقایسه میانگین درصد مهار رادیکال‌های آزاد DPPH غلظت‌های مختلف عصاره‌های متابولی میوه‌ی دو واریته بلوط و آنتی اکسیدان‌های سنتزی.

حروف غیر مشابه در هر غلظت بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است.

جدول ۲- مقایسه میانگین مقادیر EC₅₀ (میکروگرم عصاره در میلی لیتر) برای عصاره‌های متابولی دو واریته بلوط، BHT و BHA

عصاره	واریته			
	کاستانیفولیا	برانی	BHA	BHT
EC ₅₀	۴۲/۸۴ ^c	۷۰/۴۰ ^b	۸۹/۴۶ ^a	۴۱/۷۳ ^c

حروف غیر مشابه در هر سطر بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ است.

جدول ۳- حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) (میلی گرم/میلی لیتر) عصاره‌های مтанولی میوه دو واریته بلوط

باکتری	شماره باکتری	نوع باکتری (+/-)	پرسیکا	واریته	کاستانیفولیا
باسیلوس سرئوس	PTCC 1015	+	۱/۲۵	۰/۳۱۲	۰/۳۱۲
استافیلوکوکوس اورئوس	ATCC 1885	+	۱/۲۵	۰/۳۱۲	۰/۳۱۲
میکروکوکوس لوئوس	ATCC 79840	+	۱/۲۵	۰/۳۱۲	۰/۳۱۲
اشرشیا کلی	Esbl+	-	۵	۲/۵	۲/۵
سالمونلا تیفی	PTCC 1639	-	۲/۵	۲/۵	۲/۵
یرسینیا انتروکولیتیکا	PTCC 1151	-	۱/۲۵	۰/۶۲۵	۰/۶۲۵
شیگلا دیسانتری	PTCC 1188	-	۲/۵	۲/۵	۲/۵
سیتروباکتر فروندي	ATCC 24580	-	۵	۵	۵

جدول ۴- حداقل غلظت کشنده (MBC) (میلی گرم/میلی لیتر) عصاره‌های مтанولی میوه دو واریته بلوط

باکتری	نوع باکتری (+/-)	پرسیکا	واریته	کاستانیفولیا
باسیلوس سرئوس	+	۱/۲۵	۰/۳۱۲	۰/۳۱۲
استافیلوکوکوس اورئوس	+	۱/۲۵	۱/۲۵	۱/۲۵
میکروکوکوس لوئوس	+	۲/۵	۲/۵	۲/۵
اشرشیا کلی	-	۵	۵	۵
سالمونلا تیفی	-	۵	۵	۵
یرسینیا انتروکولیتیکا	-	۵	۲/۵	۲/۵
شیگلا دیسانتری	-	۵	۱۰	۱۰
سیتروباکتر فروندي	-	۱۰	۵	۵

فعالیت رادیکال‌زدایی عصاره‌ها به طور معنی دار افزایش نیافت که با نتایج به دست آمده در این بررسی مطابقت داشت. در بررسی دیگری فعالیت آنتی اکسیدانی دو نوع قارچ وحشی (*Ld*) (*Lactarius*) را مورد بررسی *Tricholoma portentosum* (Tp) و *deliciosus* (Tp) گرفت. مقادیر EC₅₀ برای قارچ‌های *Ld* و *Tp* به ترتیب ۸/۵۲ و ۲۲/۹ میلی گرم در میلی لیتر بود. تفاوت‌های مشاهده شده بین مقادیر EC₅₀ عصاره‌ی مтанولی دو نوع قارچ را به تفاوت در مقدار ترکیبات فنولی آنها نسبت داد (Ferreira et al, 2007). مقدار ترکیبات فنولی آنها نسبت دادند (Rakic et al, 2007). مقدار ترکیبات فنولی در عصاره *Ld* و *Tp* به ترتیب ۱۷/۲۵ و ۱۰/۸۰ میلی گرم گالیک اسید در گرم عصاره بود. همانطور که مشاهده شد، یافته‌های به دست آمده توسط سایر محققین حاکی از آن است که بین مقدار ترکیبات فنولی عصاره‌های گیاهی با فعالیت ضد رادیکالی آنها ارتباط وجود دارد. این یافته‌ها با نتایج تحقیق حاضر را تائید می‌نماید.

فعالیت ضد میکروبی عصاره‌ها

فعالیت ضد میکروبی عصاره‌های مтанولی دو واریته بر تعدادی از باکتری‌های پاتوژن موجود در مواد غذائی مورد بررسی قرار گرفت و

تفاوت‌های مشاهده شده بین EC₅₀ عصاره‌های مختلف در این تحقیق را می‌توان به تفاوت در مقادیر ترکیبات فنولی آنها نسبت داد. میزان ترکیبات فنولی، به طور مستقیم فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ضریب همبستگی معکوسی بین مقدار ترکیبات فنولی عصاره‌ها با آنها به دست آمد $P = -0/99$ ($r = -0/99$) که خود موید این است که عصاره‌هایی که حاوی مقادیر بیشتری از ترکیبات فنولی می‌باشند، در غلظت‌های پائین توانایی بیشتری در مهار رادیکال‌های آزاد از خود نشان می‌دهند. محققین دیگری نیز توانایی عصاره‌های گیاهی مختلف را در مهار رادیکال‌های آزاد DPPH مورد بررسی قرار داده‌اند. در بررسی انجام شده روی دو گونه‌ی بلوط کوئرکوس کریس و کوئرکوس روبور، میزان مهار رادیکال‌های DPPH در غلظت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت عصاره مтанولی از ۱۰۰-۱۲/۵ میکرو گرم در میلی لیتر درصد مهار رادیکال‌های آزاد به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. مقادیر EC₅₀ برای دو واریته کریس و روبور به ترتیب ۸/۸۸ و ۸/۰۴ میکرو گرم در میلی لیتر بود (Rakic et al, 2007).

مقایسه با MP نسبت داد. عصاره اتانولی گیاه *Eclipta prostrata* نیز در مقایسه به سایر حلال‌ها (آب، هگزان، اتیل استات) نقش مؤثری در جلوگیری از رشد همه باکتری‌های مورد آزمون داشت که به مقادیر بالاتر ترکیبات فنولی این عصاره نسبت داده شد (Karthikumar et al, 2007). عصاره‌ها و انسان‌های گیاهی می‌توانند عملکردهای مختلفی را در مقابل سویه‌های باکتریائی از خود نشان دهند که از آن جمله می‌توان به تداخل با غشای فسفولیپیدی دو لایه‌ای سلول اشاره کرد که به دنبال آن نفوذ پذیری غشاء افزایش و مواد درون سلولی کاهش می‌یابد. از سایر مکانیسم‌ها می‌توان به آسیب به آنزیم‌های دخیل در تولید انزیمی و ترکیبات ساختاری سلول Kotzekidou et (al, 2008) بر روی تعدادی از باکتری‌های گرم منفی با روش بلوط (*Q. branti*) دیگری دیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تاثیر عصاره روی باکتری‌های اشرشیاکلی و سودوموناس میراپلیس قابل ملاحظه و واپسی به غلظت بوده، اما تاثیر چندانی روی باکتری شیگلا فلکسنری نداشته است. خسروی و بهزادی (2008) فعالیت ضد میکروبی پوسته بلوط را به حضور ترکیبات تاننی در آن نسبت دادند. در پژوهش دیگری فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی (۵۰٪) میوه بلوط با روش انتشار دیسک ارزیابی و با تعدادی از آنتی بیوتیک‌های رایج مقایسه شد. نتایج نشان داد که اثر عصاره‌ها بر روی باکتری‌ها واپسی به غلظت بوده است. در مقایسه با آنتی بیوتیک‌ها نیز غلظت ۷۵ mg/ml عصاره‌ها بر استافیلوكوکوس اورئوس مشابه جنتامایسین بوده است. این اثر بر روی باکتری اشرشیاکلی کمتر از جنتامایسین و کانامایسین و بیشتر از ثوبرامایسین بوده است (ابراهیمی و همکاران، ۱۳۸۸). شهیدی و همکاران (2004) فعالیت ضد میکروبی عصاره متانولی *Q. acerifolia* را در غلظت ۲۰ mg/ml مورد بررسی قرار دادند اما هیچ گونه منطقه مهاری برای باکتری‌های استافیلوكوکوس اورئوس، استافیلوكوکوس اپیدرمیدیس و اشرشیاکلی گزارش نکردند. در نتیجه در مقایسه با عدم خاصیت ضد میکروبی عصاره گونه فوق، اثر عصاره متانولی واریته‌های مورد بررسی در این تحقیق بر روی باکتری‌های نامبرده بسیار بیشتر بوده است. سالاری و همکاران (۱۳۸۷) فعالیت ضد میکروبی عصاره‌های مختلف هسته انگور را با تعیین حداقل غلظت کشنده‌گی عصاره‌ها مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از توانایی بالای این عصاره‌ها در از بین بردن باکتری‌های مورد بررسی بود. از نظر میزان MBC بین عصاره‌های مختلف اختلاف معنی‌داری وجود نداشته و در مورد باکتری‌های سالمونلا انتریدیس، اشرشیاکلی و انترباکتر آئروژنر این میزان ۱۰۰۰ پی‌پی‌ام و برای استافیلوكوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنر، ۵۰۰ پی‌پی‌ام بود. تاثیر ۱۸ عصاره گیاهی مختلف را بر روی تعدادی از باکتری‌ها با روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، اشرشیا

نتایج به دو شکل MBC و MIC در جداول ۳ نشان داده است. میزان MIC عصاره‌های MC و MP به ترتیب در محدوده غلظت ۵-۱۰ و ۱۰-۱/۲۵ میلی گرم در میلی لیتر و میزان MBC آنها نیز ۱۰-۱۰ و ۱۰-۱/۲۵ میلی گرم در میلی لیتر متغیر بود. نتایج نشان داد هر دو عصاره مورد بررسی در غلظت‌های مختلف باکتری‌های گرم مثبت نسبت به باکتری‌های گرم منفی حساسیت بیشتری نشان دادند. باکتری‌های گرم منفی علاوه بر پیتیدوگلیکان، یک لایه دیگر به نام غشای خارجی در دیواره سلولی خود دارند. سطح هیدروفیلی این غشا که غنی از مولکول‌های لیپوپلی ساکاریدی می‌باشد به عنوان مانع در برابر آنتی بیوتیک‌ها عمل می‌کند. همچنین آنزیم‌های موجود در فضای پری پلاسمایی، قادرند مولکول‌های ورودی از بیرون را بشکنند اما در مورد باکتری‌های گرم مثبت، مواد ضد میکروبی به راحتی دیواره سلولی و غشای سیتوپلاسمی را تخریب کرده که منجر به نشت سیتوپلاسم و انقاد آن می‌شوند (Duffy & Power, 2001). با توجه به موارد گفته شده علت MBC بالاتر در مورد باکتری‌های گرم منفی نسبت به انواع مثبت توجیه می‌شود.

نتایج حاکی از آن بود که عصاره MC بر اکثر باکتری‌های مورد بررسی اثر بازدارندگی بیشتری داشت. رشد تمامی باکتری‌های گرم مثبت در غلظت ۰/۳۱۲ mg/ml این عصاره مهار شد، این در حالیست که برای مهار رشد باکتری‌های نامبرده به غلظت‌های بیشتری از عصاره MP نیاز بود (۱/۲۵ mg/ml). از بین باکتری‌های گرم منفی عصاره سیتوپلاستیکا مقاومت کمتری نشان داد. حداقل غلظت مهار بیشینیا انتروکولیتیکا مقاومت کمتری نشان داد. حداقل غلظت MC برای کشنده‌گی برای باکتری‌های گرم منفی در حضور عصاره شیگلا دیسانتری و شیگلا انتروکولیتیکا مساوی بود اما در اشرشیاکلی، سالمونلا تیفی و شیگلا دیسانتری مساوی بود اما در حضور عصاره MP به ترتیب سیتروباکتر و اشرشیاکلی، سالمونلا تیفی و شیگلا دیسانتری و در نهایت بیشینیا انتروکولیتیکا بیشترین غلظت مهار کشنده‌گی را به خود اختصاص دادند. همانطور که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، عصاره‌ها روی تمامی باکتری‌های مورد بررسی اثر کشنده‌گی داشته‌اند. میزان MBC مربوط به MP در مقابل باکتری میکروکوکوس و استافیلوكوکوس اورئوس مساوی MC بود، اما در مورد باسیلوس سرئوس عصاره MC تاثیر بیشتری داشت. در مورد عصاره MP کمترین اثر باکتری کشنده مربوط به سیتروباکتر شیگلا دیسانتری بود به طوری که تنها غلظت‌های بالای این عصاره‌ها (۱۰ mg/ml) اثر کشنده‌گی داشتند. در مورد سایر باکتری‌های گرم منفی، غلظت‌های پائین تری عصاره MC تاثیر قابل ملاحظه‌تری نسبت به MP داشتند. فعالیت ضد میکروبی بالاتر عصاره MC را می‌توان به مقادیر بالاتر ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی این عصاره در

می باشد. حضور این ترکیب تنها در عصاره MC تشخیص داده شد. تعداد و موقعیت گروههای هیدروکسیل فاکتور کلیدی در فعالیت ضد میکروبی ترکیبات فنولی به شمار می آید. با افزایش تعداد گروههای هیدروکسیل، فعالیت میکروبی افزایش می یابد (Cowan, 1999). فعالیتهای ضد میکروبی فلاونوئیدها در نتیجه توانائی تشکیل کمپلکس با دیواره سلولی باکتری‌ها می باشد و بنابراین از این طریق از رشد میکرووارگانیسم جلوگیری می کنند. ترکیبات فنولی از طریق واکنش با گروههای سولفیدریل یا بر هم کنش‌های غیر اختصاصی با پروتئین‌ها، از فعالیت آنزیمی جلوگیری به عمل آورده و بدین ترتیب فعالیت ضد میکروبی خود را اعمال می کنند. ترکیبات فنولی میوه و پوست سه گونه بلوط کوتکوس سوبر، الیکس و روتوندیفولیا را با روش کروماتوگرافی مایع مجهر به آشکارسازهای دیوداری بررسی شد. ۳۲ ترکیب فنولی مختلف در نمونه‌ها شناسایی گردید که اکثر آنها از نوع استرهای گالویل گلوکز یا از مشتقات الایچیک اسید بودند. نوع و میزان ترکیبات فنولی در دو گونه‌ی الیکس و روتوندیفولیا مشابه و از نوع مشتقات اسید گالیک بودند، در حالی که ترکیبات فنولی گونه سوبر از مشتقات الایچیک اسید تشخیص داده شدند. پوست گونه سوبر نیز نسبت به دو گونه دیگر مقدار بیشتری از ترکیبات فنولی را دارا بود (Cantos et al, 2003). در زمینه‌ی اندازه‌گیری مقدار و نیز شناسایی نوع ترکیبات فنولی میوه بلوط به ویژه گونه‌های ایرانی، بررسی‌های اندکی انجام شده است و اکثر تحقیقات در این زمینه بیشتر به اندازه-گیری و تعیین درصد تانن این میوه محدود شده‌اند. مسعودی نژاد و رضازاده آذری (۱۳۸۲) میزان تانن ده گونه‌ی بلوط ایران را اندازه-گیری و گزارش کردند میزان تانن گونه‌ها از ۷/۵٪ تا ۲/۲٪ متغیر بود. اکثر محققین فعالیت ضد میکروبی عصاره بخش‌های مختلف گیاه بلوط را به تانن‌های آن نسبت داده اند.

مهم‌ترین عاملی که فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی را تحت تاثیر قرار می دهد، ساختار شیمیائی آنهاست. توانائی اهداء الکترون یا هیدروژن، تشکیل کمپلکس با فلزات و فعالیت ضد رادیکالی این ترکیبات با تعداد گروههای هیدروکسیل موجود در حلقه آروماتیک و موقعیت قرار گرفتن آنها مرتبط است. علاوه بر این حضور سایر گروه‌ها نظیر استیل و متوكسیل و موقعیت آنها نسبت به گروههای هیدروکسیل نیز عامل مهمی است که در ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی است باید به آن توجه نمود (Sroka & Cisowski, 2003). اسید گالیک با دارا بودن ۳ گروه هیدروکسیل فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری از خود نشان می دهد. جایگزین شدن دو گروه هیدروکسیل آن با دو گروه متوكسیل از قدرت آنتی اکسیدانی آن می کاهد. بنابراین اسید سیرینجیک نسبت به اسید گالیک توانائی کمتری در اهداء الکترون از خود نشان می دهد. در کل، فعالیت آنتی اکسیدانی هیدروکسیل سینامیک اسیدها نسبت به هیدروکسیل-بنزوئیک‌ها بیشتر است محققین زیادی با مقایسه فعالیت آنتی

کلی حساس ترین سویه باکتری بود و رشد آن توسط تمامی عصاره‌ها مهار شد و به دنبال آن سالمونولا تیفی موریوم و استافیلکوکوس اورئوس قرار گرفتند (Kotzekidou et al, 2008). اسانس‌های گیاهی نیز دسته دیگری از ترکیبات دارای خواص ضد میکروبی می-باشند. برومند و همکاران (۱۳۸۷) خاصیت ضد میکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز را بر روی تعدادی از باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت بررسی کردند. نتایج نشان داد که استافیلکوکوس اورئوس و سالمونولا تیفی موریوم به ترتیب حساس‌ترین و مقاوم‌ترین باکتری به هر دو اسانس بودند و اسانس بذر گشنیز نسبت به شوید اثر کشنندگی بیشتری بر باکتری‌های گرم منفی داشت. مقایسه نتایج حاصل از مطالعات مختلف پیچیده به نظر می رسد چرا که نتایج با فاکتورهای نظیر دما، زمان انکوباسیون، pH محیط و نوع محیط کشت، فاز رشد میکرووارگانیسم و حجم محیط کشت مورد استفاده تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین، ترکیب شیمیایی، نوع و مکانیسم عمل ترکیبات فنولی هر یک از عصاره‌ها از عوامل مؤثر در ایجاد اختلاف نتایج در فعالیت ضد میکروبی حلال‌ها می باشند (Wen et al, 2003).

تعیین نوع ترکیبات فنولی عصاره‌ها با کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا

ترکیبات فنولی موجود در عصاره‌ها با مقایسه‌ی زمان بازداری پیک‌های نمونه با زمان بازداری پیک‌های مربوط به استانداردهای اسیدهای فنولی تعیین گردید. جدول ۵ نوع ترکیبات فنولی هر عصاره را نشان می دهد. همانطور که در جدول ۵ دیده می شود، ترکیب مشترک بین عصاره‌ها اسید گالیک، اسید کلروژنیک و اسید کافئیک بود. اسید گالیک از مشتقات هیدروکسیل-بنزوئیک اسیدهای فنولی بوده و در ساختار خود دارای ۳ گروه هیدروکسیل می باشد و به دلیل قطبیت بالا زودتر از سایر ترکیبات از ستون خارج می شود. عصاره‌ی MP حاوی مقادیر جزئی از اسید سیرینجیک بودند. این ترکیب نیز یکی از مشتقات هیدروکسیل-بنزوئیک اسیدهای فنولی محسوب می شود که در ساختار خود دارای ۲ گروه متوكسیل و یک گروه هیدروکسیل می باشد. مشتقات هیدروکسیل سینامیک اسید دسته‌ی دیگری از اسیدهای فنولی موجود در گیاهان می باشند که تفاوت آنها با مشتقات بنزوئیک اسید حضور یک گروه کربوکسیل در ساختار آنها است. اسید p-کوماریک، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و اسید فرولیک در این گروه قرار دارند. اسید کافئیک در ساختار خود دارای دو گروه هیدروکسیل ا است و از استری شدن آن با اسید کوئینیک، اسید کلروژنیک حاصل می گردد. از بین ترکیبات مورد بررسی اسید p-کوماریک بیشترین زمان بازداری را داشت و آخرین پیک موجود در کروماتوگرام مربوط به مخلوط استانداردها مربوط به این ترکیب

فعالیت آنتی اکسیدانی را تأیید می‌نماید. در عصاره‌ی MC حضور اسید گالیک، اسید کافئیک، اسید کلروژنیک و اسید p-کوماریک، با فعالیت ضد رادیکالی بالای آن همراه است. در زمان بازداری ۹/۴ پیک بزرگی در کروماتوگرام این عصاره مشاهده شد، که با زمان بازداری هیچ کدام از استانداردهای مورد استفاده در این بررسی مطابقت نداشت. احتمالاً فعالیت آنتی اکسیدانی بالای این عصاره علاوه بر ترکیبات نامبرده، با حضور این ترکیب ناشناخته نیز مرتبط است. وجود ترکیباتی نظیر اسید کافئیک، اسید گالیک، اسید کلروژنیک و اسید سیرینجیک قدرت آنتی اکسیدانی بالای عصاره متانولی واریته‌ی QB را تأیید می‌کند.

اکسیدانی اسید کافئیک و اسید کلروژنیک گزارش کردند، استری شدن اسید کافئیک با اسید کوئینیک از قدرت آنتی اکسیدانی و توانایی مهار رادیکال‌های آزاد هیدروپراکسید و DPPH آن می‌کاهد. قدرت آنتی اکسیدانی بالاتر اسید کافئیک با حضور دو گروه هیدروکسیل در ساختار آن مرتبط است. اسید p-کوماریک اسید نیز با داشتن یک گروه هیدروکسیل می‌تواند نقش به سازنی در مهار رادیکال‌های آزاد داشته باشد اما قدرت آنتی اکسیدانی آن کمتر از اسید فرولیک و اسید کافئیک است (Andreasen et al, 2001). نتایج به دست آمده در آنالیز ترکیبات فنولی عصاره‌ها، نتایج حاصل از آزمون‌های ارزیابی

جدول ۵- نوع ترکیبات فنولی موجود در عصاره‌های متانولی دو واریته بلوط

عصاره	زمان بازداری (دقیقه)	نوع ترکیب
MP	MC	
+	+	اسید گالیک
+	+	اسید کلروژنیک
+	+	اسید کافئیک
+	-	اسید سیرینجیک
-	-	وانیلین
-	-	اسید فرولیک
-	+	اسید p-کوماریک

علامت + و - به ترتیب نشان دهنده حضور و عدم حضور ترکیبات فنولی در عصاره‌ها می‌باشد.

های سنتزی بر سلامت انسان و نیز مقاومت سویه‌های باکتریائی به آنتی بیوتیک‌ها، مطالعات بیشتر در زمینه کاربرد این عصاره‌ها در سیستم‌های غذائی فاسد شدنی پیشنهاد می‌گردد. بدین ترتیب با شناسائی ویژگی‌های ارزشمند میوه بلوط، از هدر رفتن مقادیر انبوهی از این میوه در مناطق جنگلی کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که میوه بلوط دو واریته مورد بررسی حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فنولی می‌باشد. حضور ترکیبات فنولی نظیر اسید گالیک، اسید کافئیک، اسید کلروژنیک در عصاره میوه بلوط با فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی قابل توجه این عصاره‌ها همراه است. با توجه به اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان-

منابع

- ابراهیمی، ا، خیامی، م. و نجاتی، و، ۱۳۸۸، ارزیابی فعالیت ضد باکتریائی عصاره هیدرووالکلی میوه بلوط ایرانی در روش انتشار دیسک، فصلنامه گیاهان داروئی، ۳۳، ۳۴-۲۶.
- Anethum برومند، ع، حامدی، م، امام جمعه، ز، رضوی، ۵ و گلمکانی، م.ت، ۱۳۸۷، بررسی خاصیت ضد میکروبی اسانس بذرهای شوید (Coriandrum sativum) و گشنیز (graveolens) بر روی استافیلوكوکوس اورئوس، اشرشیاکلی O157:H7، سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از آزمایش حساسیت رفت در محیط مایع، مجله پژوهش‌های علوم و صنایع غذائی ایران، ۴(۱)، ۵۹-۶۸.
- حاجی شریفی، ا، ۱۳۸۲، اسرار گیاهان داروئی، انتشارات حافظ نوین، ۲۰۰-۲۰۴.
- سالاری، ا، حبیبی نجفی، م.ب، فرهوش، ر، مرعشی، ح، ۱۳۸۷، بررسی اثر سیستم‌های مختلف حلal بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضد میکروبی آن، مجله پژوهش‌های علوم و صنایع غذائی ایران، ۴(۲)، ۷۱-۷۹.
- مسعودی نژاد، م.ر، و رضازاده آذری، م، ۱۳۸۲، مقایسه چهار روش استخراج تانن از میوه‌های گونه‌های مختلف بلوط ایران، مجله پژوهشی حکیم، ۱، ۸۱-۹۱.

Alothman, M., Bhat, R. & Karim, A.A., 2009, Antioxidant capacity and phenolic content of selected tropical fruits from Malaysia, extracted with different solvents. Food Chemistry, 115, 785-788.

Andreasen, M. F., Landbo, A.K., Christensen, L. P., Hansen, A. & Meyer, A.S., 2001, Antioxidant effects of phenolic rye (*Secale cereale* L.) extracts, monomeric hydroxycinnamates, and ferulic acid dehydrodimers on human low-density lipoproteins. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, 4090-4096.

- Arabshahi, D.S., 2006, Studies on selected plant extracts with reference to their nutritional and pharmacological characteristics. PhD Thesis. Mysore India: University of Mysore, Department of Studies in Food Science and Nutrition.
- Burt, S., 2004, Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods – A review. International Journal of Food Microbiology, 94, 223–253.
- Cantos, E., Espn, J.C., Lpez-Bote, C., Hoz, H., Ordez, J.A. & Toms-Barbern, F.A., 2003, Phenolic Compounds and Fatty Acids from Acorns (*Quercus spp.*), the Main Dietary Constituent of Free-Ranged Iberian Pigs. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 51, 6248-6255.
- Chang, C., Yang, M., Wen, H. & Chern, J., 2002, Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Journal of Food & Drug Analaysis, 10, 178-182.
- Cowan, M.M., 1999, Plant Products as Antimicrobial Agents. Clinical Microbiology Review, 12, 564-582.
- Demirci, F., Guven, K., Demirci, B., Dadandi, M. Y., & Baser, K. H. C., 2008, Antibacterial activity of two *Phlomis* essential oils against food pathogens. Food Control, 19, 1159–1164.
- Duffy, C.F. & Power, R.F., 2001, Antioxidant and antimicrobial properties of some Chinese plant extracts. International Journal of Antimicrobial Agents, 17, 527-529.
- Ebrahimabadi, A.H., Ebrahimabadi, E.H., Jafari-Bidgoli, Z., Jookar Kashi, F., Mazoochi, A. & Batooli, H., 2010, Composition and antioxidant and antimicrobial activity of the essential oil and extracts of *Stachys inflata* Benth from Iran. Food Chemistry, 119, 452-458.
- Faller, A.L.K. & Fialho, E., 2009, The antioxidant capacity and polyphenol content of organic and conventional retail vegetables after domestic coking. Food Research International, 42, 210-215.
- Ferreira, I.C.F.R., Baptista, P., Vilas-Boas, M. & Barros, L., 2007, Free-radical scavenging capacity and reducing power of wild edible mushrooms from northeast Portugal: Individual cap and stipe activity. Food Chemistry, 100, 1511-1516.
- Jung, C.H., Seog, H.M., Choi, I.W., Park, M.W. & Cho, H.Y., 2006, Antioxidant properties of various solvent extracts from wild ginseng leaves. LWT, 39, 266-274.
- Karthikumar, S., Vigneswari, K. & Jegatheesan, K., 2007, Screening of antibacterial and antioxidant activities of leaves of *Eclipta prostrata* (L). Scientific Research & Essay, 2, 101-104.
- Khosravi A. D. & Behzadi A., 2006. Evaluation of The Antibacterial Activity of The Seed Hull of *Quercus Branti* on some Gram Negative Bacteria. Pakistanian Journal of Medicine Science, 22, 429 - 32.
- Kotzekidou,P.,Giannakidis,P.& Boulamatsis, A., 2008, Antimicrobial activity of some plant extracts and essential oils against foodborne pathogens in vitro and on the fate of inoculated pathogens in chocolate. LWT, 41, 119–127.
- Liu, Q. & Yao, H., 2007, Antioxidant activities of barley seeds extracts. Food Chemistry, 102, 32–737.
- Majhenic, L., Skerget, M. & Knez, Z., 2007, Antioxidant and antimicrobial activity of guarana seed extracts. Food Chemistry, 104, 1258–1268.
- Moure, A., Cruz, J. M., Franco, D., Dominguez, M., Sineiro, J. & Dominguez, H., 2001, Natural antioxidants from residual sources. Food Chemistry, 72, 145–171.
- National committee for clinical laboratory standards., 2000, Methods for dilution antimicrobia susceptibility tests for bacteria that grow aerobically (5th ed.). Approved standard, M7-A5. Pennsylvania: Wayne.
- Oroojalian, F., Kasra-Kermanshahi., Azizi, M. & Bassami, M. R., 2010, Phytochemical composition of the essential oils from three Apiaceae species and their antibacterial effects on food-borne pathogens. Food Chemistry, 120, 765–770.
- Prasad, K.N., Yang, B., Dong, X., Jiang, G., Zhang, H., Xie, H. & Jiang, Y., 2009, Flavonoid contents and antioxidant activities from *Cinnamomum* species. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 10, 627-632.
- Rakic, S., Petrovic, S., Kukic, J., Jadranin, M., Tesevic, V., Povrenovic, D. & Siler-Marinkovic, S., 2007, Influence of thermal treatment on phenolic compounds and antioxidant properties of oak acorns from Serbia. Food Chemistry, 104, 830-834.
- RuMPaoa, R.G.O., Cornago, D.F. & Geronimo, I.M., 2009, Phenolic content and antioxidant capacity of Philippine potato (*Solanum tuberosum*) tubers. Journal of Food Composition and Analysis, 22, 546-550.
- Sanchez-Moreno, C., Larrauri, J. A. & Saura-Calixto, F., 1999, Free radical scavenging capacity and inhibition of lipid oxidation of wines, grape juices and related polyphenolic constituents. Food Research International, 32, 407–412.
- Shahidi, B.G., Aghighi, S. & Karimi Nik, A., 2004, Antibacterial and Antifungal Survey in Plants used in Indigenous Herbal-Medicine of South East Regions of Iran. Journal of Biological Science, 4, 405 - 12.
- Singh, S. & Singh, R.P., 2008, In Vitro Methods of Assay of Antioxidants: An Overview. Food Reviews International, 24, 392-415.
- Slinkard, K. & Singleton, V. L., 1977, Total phenol analysis; automation and comparison with manual methods. American Journal of Enology & Viticulture, 28, 49-55.
- Sroka, Z. & Cisowski, W., 2003, Hydrogen peroxide scavenging, antioxidant and anti-radical activity of some phenolic acids. Food & Chemical Toxicology, 41, 753-758.
- Thoo, Y.Y., Ho, S.K., Liang, J.Y., Ho, C.W. & Tan, C.P., 2010, Effect of binary solvent extraction system, extraction

- time and extraction temperature on phenolic antioxidant capacity from mengkudu (*Morinda citrifolia*). *Food Chemistry*, 120, 290-295.
- Wen, A., Delaquis, P., Stanich, K. & Toivonen, P., 2003. Antilisterial activity of selected phenolic acids. *Food Microbiology*, 56, 305–311.
- Yildirim, A., Mavi, A. & Kara, A.A., 2001, Determination of antioxidant and antimicrobial activities of *Rumex crispus* L. extracts. *Journal of Agricultural & Food Chemistry*, 49, 4083-4089.
- Zhou, K. & Yu, L., 2004, Effects of extraction solvent on the wheat bran antioxidant activity estimation. *LWT*, 37, 717-721.

Evaluation of Antiradical and Antimicrobial Activity of Methanolic Extract of Two Acorn Varieties and Detection of Phenolic Compound with High Performance Liquid Chromatography

M. Ghaderi^{1*}- A. Sadeghi Mahoonak²- M. Aalami³ - M. Khomeiri⁴- R. Rezaei⁵

Received: 29-11-2010

Accepted: 25-7-2011

Abstract

In this study, total phenolics and flavonoids content, antiradical and antimicrobial activity of methanolic extract of two Iranian acorn varieties, namely *Quercus.castaneifolia* var *castaneifolia* and *Quercus.branti* var *persica* were evaluated. Total phenolic and flavonoid content and extraction yield of methanolic extract of castaneifolia variety (MC) were significantly higher than that of the extract of persica variety (MP). Extracts were also tested for their antioxidant activities using scavenging activity of 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl and compared with synthetic antioxidant namely BHA and BHT. EC₅₀ values for MC, MP, BHA and BHT were 42.84, 70.40, 89.46 and 41.73 mg/ml, respectively. The extracts also showed good antimicrobial activity against all of tested microorganisms and the tested gram-negative bacteria was more resistant to the inhibitory effect of extracts. The ranges of minimum inhibitory concentration (MIC) of the extracts were 0.312-5 and 1.25-5 mg/ml for MC and MP, respectively. There was no difference between the MIC of MC and MB extract against *Salmonella typhi* and *Shigella dysenteriae* but MC extract showed the strongest activity on *Escherichia coli* and *Yersinia entrocolitica* at lower concentration. MP extract at concentration of 5mg/ml had bactericidal effect on all of gram negative bacteria (except *Citrobacter*). The most efficient bactericidal activity of MC extract was against *Bacillus cereus*, with MBC = 0.312 mg/ml while *Shigella dysenteriae* had the highest MBC (10mg/ml). A high-performance liquid chromatography was used for determination of phenolic acids of extracts. gallic, caffeic, *p*-coumaric and cholorogenic acid were found in MC and Gallic, caffeic, cholorogenic and sirinjic acid were detected in MP extract.

Keywords: Acorn fruit, Antimicrobial activity, Gallic acid, Methanolic extract, Phenolic Compounds

1&5- Former MSc Students, Dept. of Food Science & Technology, Gorgan University of Agricultural sciences & Natural Resources, Gorgan, Iran.

(*- Corresponding author Email: mghaderi_gh@yahoo.com)

2&3- Assistant Professor, Dept. of Food Science & Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan, Iran.

4- Associate Professor, Dept. of Food Science & Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan, Iran.