



Research Article
Vol. ?, No. ?, ?? ?, p. ???

Effect of Chitosan Coating with Different Degrees of Deacetylation on the Shelf Life of Button Mushroom (*Agaricus bisporus*)

H. Ghorbanzadeh¹, J. Mohammadzadeh Milani^{ID2*}, A. Motamedzadegan²

1 and 2- M.Sc.Graduated Student and Professor, Department of Food Science and Technology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran, respectively.

(*- Corresponding Author Email: j.milani@sanru.ac.ir)

Received: 13.11.2023

Revised: 11.12.2023

Accepted: 14.12.2023

Available Online: 16.12.2023

How to cite this article:

Ghorbanzadeh, H., Mohammadzadeh Milani, J., & Motamedzadegan, A. (?). Effect of chitosan coating with different degrees of deacetylation on the shelf life of button mushroom (*Agaricus bisporus*). *Iranian Food Science and Technology Research Journal*, (In Press). <https://doi.org/10.22067/ifstrj.2023.85321.1293>

Introduction

With the growth of the population and increasing demand for obtaining food and supplying the required food, the interest in the cultivation and consumption of edible mushrooms has increased. Since 1990, the world has focused on the mushroom production industry. In recent years, mushrooms have become one of the most important food and medicinal sources. One of the largest species of edible mushroom is button mushroom (*Agaricus bisporus*), which has high nutritional value due to the presence of fiber, carbohydrates, protein, amino acids, minerals, vitamins, etc., and also its antioxidant, anti-cancer, and anti-diabetic properties. This commodity has shown good health benefit for humans. The quality of button mushrooms is determined by their color, texture, and taste. Color is the first characteristic that is perceived by consumers. Browning is one of the main reasons for the loss of mushroom quality, which reduces the commercial value of mushrooms. Edible coating is considered as the best method for maintaining quality of perishable foods, these coatings almost prevent the penetration of oxygen, depending on the type of coating used, and reduce the loss of moisture during storage. Chitosan has functional characteristics such as antimicrobial and antioxidant properties. The purpose of this research was to find a suitable chitosan coating for button mushrooms that can maintain its characteristics such as color, texture hardness, and moisture during the storage period and increase the shelf life of mushroom.

Materials and Methods

To make chitosan solutions, first, each type of chitosan (70% deacetylated, 80% deacetylated, 90% deacetylated, and 100% deacetylated) was weighed in amounts of 0.5g, 1g, and 2g., then it was dissolved in 100 ml of 0.5% acetic acid and stirred for 12 hours at a speed of 1000 rpm at room temperature to dissolve uniformly. After 12 hours, each sample was centrifuged for 15 minutes at 6000 rpm at 25°C to separate undissolved materials. Mushrooms were prepared freshly harvested, washed with water, and then excess water was removed. After sorting and screening in terms of size and approximate weight, the mushrooms were added to 0.5%, 1%, and 2% chitosan solutions without being sliced and were immersed in the solution for one minute. The control sample was immersed in 0.5% acetic acid solution for one minute. After that, the mushrooms were air-dried at room temperature for one hour, and at the end, their excess water was removed with a tissue. The mushrooms were placed in 18*14 size polyethylene zip lock bags and stored in a refrigerator at 4°C. The effects of chitosan coating on weight loss, color and browning index, enzyme activity, texture, and total phenolic compounds of mushroom were studied.

Results and Discussion

The spoilage of edible mushrooms happens in a short time, and the storage of mushrooms has become one of the most important challenges in mushroom marketing. Coating edible mushrooms is one of the suitable methods



©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

<https://doi.org/10.22067/ifstrj.2023.85321.1293>

to increase the shelf life of edible mushrooms. In this research, chitosan with four degrees of deacetylation and three different concentrations was used as a coating for button mushroom. The results indicated that coating the mushroom with chitosan could delay the occurrence of spoilage and change its color or texture. Due to the very strong antimicrobial properties of chitosan, it is suggested to investigate the microbial load of edible button mushrooms and other tissue factors of the mushroom, such as gumminess, adhesive properties and cohesiveness.

Conclusion

The spoilage of edible mushrooms happens in a short time, and the storage of mushrooms has become one of the most important things in mushroom production. Coating edible mushrooms is one of the suitable methods to increase the shelf life of edible mushrooms. In this research, chitosan with four degrees of deacetylation and three different concentrations was used as a coating for button mushroom. The results indicated that coating the mushroom with chitosan could delay the occurrence of spoilage and change its color or texture. Due to the very strong antimicrobial properties of chitosan, it is suggested to investigate the microbial load of edible button mushrooms, also other tissue factors of the mushroom, such as gumminess, adhesive properties and cohesiveness can be studied.

Keywords: Button mushroom, Chitosan, Coating, Shelf life

مقاله پژوهشی

جلد ۹، شماره ۳، ۲۰۲۴ ص.

تأثیر پوشش کیتوزان با درجات مختلف استیل زدایی در ماندگاری قارچ دکمه‌ای خوراکی (*Agaricus bisporus*)

هدی قربانزاده^۱- جعفر محمدزاده میلانی^{۲*}- علی معتمدزادگان^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

چکیده

یکی از مؤثرترین روش‌ها برای افزایش طول مدت نگهداری قارچ خوراکی دکمه‌ای، استفاده از پوشش‌های خوراکی است. در این مطالعه، تأثیر کیتوزان به عنوان یکی از پوشش‌های خوراکی، با درصد‌های استیل زدایی مختلف (۷۰ تا ۱۰۰ درصد) با سه غلظت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تأثیرات پوشش کیتوزانی بر روی افت وزنی، رنگ قارچ و ان迪س قهقهه‌ای شدن، فعالیت آنزیمی، بافت و ترکیبات فنلی کل مطالعه شد. به این منظور قارچ‌ها در محلول‌های کیتوزان با غلظت‌های ۱، ۱/۵ و ۲ درصد پوشش داده شدند و برای مدت ۱۲ روز در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. نتایج آزمون‌ها حاکی از تأثیر مناسب پوشش‌دهی کیتوزان بر نمونه‌های قارچ خوراکی بود، به‌طوری‌که میزان فتل کل در تیمار کیتوزان با درجه استیل زدایی ۷۰ درصد با غلظت یک درصد، در روز دوازدهم به (45 g^{-1}) رسید، میزان آنزیم پراکسیداز در تیمار کیتوزان ۷۰ درصد استیل زدایی شده با غلظت 0.5 g^{-1} درصد، (8 g^{-1}) بود و میزان سفته نمونه در تیمار کیتوزان با درجه استیل زدایی شده ۷۰ درصد با غلظت ۲ درصد، تنها به میزان 40 g کاهش پیدا کرد در صورتی که نمونه شاهد به میزان 33.85 g سفتی خود را از دست داد. در کنترل افت وزنی، تیمار ۱۰۰ درصد استیل زدایی شده با غلظت ۲ درصد بهترین نتیجه را نشان داد و تنها 11 g درصد افت وزنی داشت. آنزیم پلی‌فنل اکسیداز در تیمار ۹۰ درصد استیل زدایی شده با غلظت ۲ درصد، در روز دوازدهم آزمایش به (67 g^{-1}) رسید. تیمار کیتوزان با درجه استیل زدایی ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد در آزمون حسی، نتیجه بهتری از ارزیاب‌ها دریافت کرد. تیمار کیتوزان با درجه استیل زدایی ۹۰ درصد و غلظت ۱/۵ درصد، عملکرد بسیار مناسبی نسبت به ان迪س قهقهه‌ای شدن نشان داد، به‌طوری‌که در روز دوازدهم آزمایش، ان迪س قهقهه‌ای شدن نمونه به میزان 85 g رسید.

واژه‌های کلیدی: پوشش، قارچ دکمه‌ای، کیتوزان، ماندگاری

صنعتی و در محیط‌هایی که دارای تأسیسات و تجهیزات است انجام می‌گردد.

از تعداد ۱۹۵۳ واحد پرورش قارچ خوراکی در کشور، ۱۹۰۹ واحد به تولید قارچ دکمه‌ای، ۳۳ واحد به پرورش قارچ صدفی و ۱۱ واحد نیز به پرورش هر دو نوع قارچ، فعالیت دارند. از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور، ۱۲۶۷ واحد فعال و 68 g واحد غیر فعال می‌باشند (نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی؛ ۱۴۰۰)

مقدار تولید انواع قارچ خوراکی در سال ۱۳۹۹ شامل ۱۰۶۶۴ تن قارچ دکمه‌ای و ۲۶۸ تن قارچ صدفی است (نتایج سرشماری از

مقدمه

چهار گونه عمده قارچ خوراکی که عبارتند از قارچ‌های دکمه‌ای، قارچ‌های صدفی، قارچ شیتاکه و قارچ فالمولینا، نزدیک به ۸۰ درصد تولید جهانی قارچ خوراکی را به خود اختصاص می‌دهند. پرورش قارچ خوراکی در ایران در قالب تولید دو نوع قارچ دکمه‌ای و قارچ صدفی انجام می‌شود. از آن جا که فعالیت قارچ دکمه‌ای به‌دلیل حساسیت بالا، باید در محیط‌هایی که درجه حرارت، نور و رطوبت به صورت دقیق کنترل می‌شود پرورش داده شود، فلذاً پرورش آن به صورت

یکی از دلایل اصلی افت کیفیت قارچ است که این موضوع ارزش تجاری قارچ را کاهش می‌دهد، به طور کلی قارچ‌های سفید بازار مناسب‌تری دارند (Wu et al., 2016). از آنجایی که قابلیت نگهداری قارچ دکمه‌ای در دمای محیط (۲۵–۲۰ درجه سانتی‌گراد) در کوتاه مدت بین ۳ تا ۴ روز و در دمای یخچال (۴ درجه سانتی‌گراد) حدود ۵ تا ۷ روز می‌باشد، ارزش اقتصادی خود را در مدت کوتاهی از دست دادن وزن و رطوبت می‌گردد و حتی ممکن است مورد حمله باکتری‌ها و میکروب‌ها نیز قرار بگیرد (Jiang, 2013).

قارچ خوارکی به دلیل فسادپذیری بالا، طی مدت زمان کوتاهی ویژگی‌های مطلوب از جمله سفیدی، بافت ترد، رطوبت، طعم و مزه ابتدایی خود را از دست می‌دهد. تغییرات اتفاق افتاده در قارچ خوارکی، باعث کاهش بازارپسندی آن در طول مدت نگهداری می‌گردد. از این‌رو یافتن روشی مناسب برای طولانی کردن مدت زمان نگهداری قارچ و حفظ ویژگی‌های آن، همواره از مطالعات مربوط به این محصول بوده است.

سبزیجات، میوه‌های تازه و قارچ‌های خوارکی به مدت طولانی پس از برداشت نیز از نظر متابولیکی فعال می‌باشند. تنفس یکی از فرآیندهای متابولیکی است که انرژی لازم برای دیگر فعالیت‌ها را فراهم می‌کند. تنفس هوایی شامل تجزیه ذخایری همچون کربوهیدرات‌ها و لیپیدها و تبدیل آن‌ها به مولکول‌های ریزتر و ساده‌تر مثل کربن دی اکسید و آب می‌شود. محصولات این عمل برای فعالیت‌های بعدی مثل فعالیت‌های آنزیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سرعت تنفس به عنوان یک معیار برای فعالیت‌های متابولیکی در نظر گرفته می‌شود. قارچ‌ها در مقایسه با سبزیجات و میوه‌ها سرعت تنفس بالاتری دارند (Ares et al., 2006). قهوة‌ای شدن آنزیمی قارچ در طول نگهداری فرآیند پیچیده‌ای است. اختلال در یکپارچگی سلولی قارچ اجازه می‌دهد تا تماس بین آنزیم و سوبستراهای آنها برقرار شود (Beaulieu et al., 2002). آنزیم اصلی عامل قهوة‌ای شدن قارچ، آنزیم پلی‌فنل اکسیداز است (Lei et al., 2018). عوامل مؤثر بر قهوة‌ای شدن آنزیمی قارچ عبارتند از: فعالیت و مقدار آنزیم پلی‌فنل اکسیداز (PPO)، محتويات ترکیبات فنلی، عوامل بیماری‌زا و محیط پس از برداشت مانند دما و رطوبت نسبی؛ بنابراین، عوامل قابل کنترل مانند محیط پس از برداشت، فعالیت PPO و عوامل بیماری‌زا از جمله پرطرفدارترین موضوعات در مطالعات پس از برداشت قارچ هستند (Joshi et al., 2018; Ghasemi-Varnamkhasti et al., 2018; Gantner et al., 2017; Zhang et al., 2018).

روش‌های مختلفی برای کنترل قهوة‌ای شدن قارچ، وجود دارد. خنک‌سازی پرکاربردترین روش در افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی است. با این حال، اثر بازدارندگی

واحدهای پژوهش قارچ خوارکی؛ (۱۴۰۰). ایران با تولید ۱۰۱۳۶۵ تن در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سایر کشورها در تولید قارچ، رتبه ۹ را به خود اختصاص داد و بعد از ایران، انگلستان با ۱۰۰۷۸۱ تن در رتبه دهم قرار گرفت. چین با ۸۹۴۰۹۹ تن در سال ۲۰۱۹ بالاترین رتبه را در تولید قارچ خوارکی دارد. ژاپن، لیلات متحده و لهستان به ترتیب در رتبه‌های ۲، ۳ و ۴ این رتبه‌بندی قرار گرفتند (FAO Source Master).

طبق نتایج سرشماری در سال ۱۴۰۰، مقدار ضایعات پس از تولید واحدهای پژوهش قارچ خوارکی در ایران، ۱۳۶۱ تن بوده که ۱/۲۵ درصد کل تولیدات را شامل می‌شود.

با رشد جمعیت و تقاضای روزافزون برای تأمین مواد غذایی، گرایش به کشت و مصرف قارچ خوارکی نیز افزایش یافته است. از سال ۱۹۹۰، جهان به صورت متمرکز صنعت تولید قارچ را دنبال کرده است. در سال‌های اخیر به دلیل طعم و محتوای مغذی، قارچ به یکی از مهم‌ترین منابع غذایی و دارویی کاربردی تبدیل شده است. علاوه بر این که پروتئین‌های قارچ می‌توانند جایگزین مناسبی برای پروتئین‌های سبد غذایی باشند؛ انواع مختلفی از ویتامین‌ها و مواد معدنی نیز در قارچ‌های خوارکی وجود دارد (Lin & Sun, 2019). یکی از بزرگ‌ترین گونه‌های قارچ خوارکی، آگاریکوس بیسپورس (*Agaricus bisporus*) است که از ارزش غذایی و دارویی بالایی برخوردار است. مصرف این قارچ در شش تا هفت دهه گذشته به طور مداوم در حال افزایش بوده است (Usman et al., 2021). قارچ دکمه‌ای نام دیگر *Agaricus bisporus* است که منبع غذایی ارزشمند با چندین ترکیب فعال زیستی مهم است. قارچ دکمه‌ای یکی از محبوب‌ترین انواع قارچ‌های خوارکی در جهان است (Louis et al., 2021). به دلیل وجود مواردی همچون فیبر، کربوهیدرات، پروتئین، آمینواسید، مواد معدنی، ویتامین‌ها و ... قارچ دکمه‌ای دارای ارزش غذایی بالا و خواص آنتی‌اکسیدانی، ضدسرطانی و خود دیابتی است (Kalač, 2013; Muszynska et al., 2017). لازم به ذکر است که لین ماده‌غذایی خواص سلامتی‌بخش مناسبی برای انسان از خود نشان داده است (Jiang et al., 2015).

A. bisporus در مقایسه با سایر گونه‌های پرمصرف از نظر کربوهیدرات، پروتئین و چربی نسبتاً غنی است. قارچ دکمه‌ای (*Agaricus bisporus*) رایج‌ترین گونه قارچ خوارکی کشت شده در سراسر جهان است و به دلیل خواص غذایی، ارگانولپتینیک و دارویی آن در بین مصرف‌کنندگان بسیار محبوب است (Nasiri et al., 2018). کیفیت قارچ دکمه‌ای با رنگ، بافت و طعم آن تعیین می‌شود. رنگ اولین مشخصه‌ای است که توسط مصرف‌کنندگان درک می‌شود (Weijn et al., 2011). اخیراً پیشرفت‌هایی در حفظ خواص قارچ دکمه‌ای صورت گرفته است (Zhang et al., 2018). قهوة‌ای شدن

کیتوzan را می‌توان با استیل زدایی جزئی یا کامل کیتین به دست آورد، گروههای استیل در زنجیره مولکولی کیتین برای تشکیل گروههای آمینه در کیتوzan حذف می‌شوند. به همین دلیل، کیتوzan را می‌توان به عنوان یک کوپلیمر طبقه‌بندی کرد که عمدتاً از ۲-آمینو-۲-دئوکسی-D-β-گلوکوپیرانوز (گلوکوزامین) و ۲-استامید-۲-دئوکسی-D-β-گلوکوپیرانوز (N-استیل گلوکوزامین) که توسط پیوندهای گلیکوزیدی β ۱ به ۴ به هم مرتبط شده‌اند (Ardean et al., 2021).

کیتوzan در آب نامحلول، اما در محلول‌های اسید آلی ضعیف محلول است. مشتقات کیتوzan به شکل استات، آسکوربیات، لاکتان و ملات محلول در آب هستند (Sudarshan, 1992; No et al., 2002).

مطالعات زیادی برای بررسی اثر پوشش‌دهی کیتوzan تا به امروز صورت پذیرفته، از جمله این پژوهش‌ها، استفاده از کیتوzan برای پوشش‌دهی گوجه‌فرنگی (El Ghaouth et al., 1992)، انبه (Ghasemnezhad et al., 2010)، موز (Chien et al. 2007)، میوه لیچی (Jiang et al., 2005) و پسته (Win et al., 2007) (Rezaiyan Attar et al., 2023) می‌باشد.

خواص منحصر به فرد کیتوzan، همچون خاصیت ضدیکروبی، تشکیل لایه محافظ و همچنین مقاومت بالا در برابر گازها و بخار آب است که آن را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده به عنوان پوشش تبدیل می‌کند (Rezaiyan Attar et al., 2022). هدف از انجام این پژوهش، یافتن پوشش کیتوzanی مناسب برای قارچ دکمه‌ای می‌باشد که بتواند ویژگی‌هایی از جمله رنگ، سختی بافت و رطوبت آن را در طول مدت نگهداری به خوبی حفظ کرده و زمان نگهداری قارچ را افزایش دهد.

مواد و روش‌ها

مواد اولیه

قارچ سفید دکمه‌ای مورد نیاز از یک واحد تولیدی تجاری قارچ در مازندران، شهر فریدون‌کنار، پودر کیتوzan استیل زدایی شده با وزن مولکولی بالا (با درجات استیل زدایی ۷۰ درصد، ۸۰ درصد و ۹۰ درصد)، از شرکت ایران کیتوzan واقع در شهر شیراز و مواد شیمیایی و معرف‌ها از شرکت سیگما تهیه شدند.

آماده‌سازی نمونه

برای ساخت محلول‌های کیتوzan، ابتدا از هر نوع کیتوzan (۷۰ درصد استیل زدایی شده، ۸۰ درصد استیل زدایی شده، ۹۰ درصد استیل زدایی شده و ۱۰۰ درصد استیل زدایی شده) به مقدار ۰/۵ گرم، ۱ گرم و ۲ گرم توزین شد، سپس در ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۵ درصد اسیداستیک حل و برای مدت ۱۲ ساعت با سرعت ۱۰۰۰ rpm در

قهقهه‌ای شدن قارچ با سرد شدن محدود است. روش‌های دیگری مانند بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده و پوشش‌دهی نیز توسط بسیاری از محققان با هدف یافتن مؤثرترین راه برای افزایش ماندگاری قارچ دکمه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است (Xu et al., 2005). باکتری‌ها، کپک‌ها، فعالیت آنزیم‌ها و تغییرات بیوشیمیایی می‌توانند از عوامل فساد قارچ‌های خوارکی به حساب آیند (Jiang, 2013). بنابراین قارچ‌های خوارکی یا باید پس از برداشت مصرف شوند و یا در مدت کوتاهی، فرآوری گرددند.

استفاده از پوشش‌های خوارکی یکی از خلاقالنه‌ترین راه‌ها برای افزایش عمر تجاری محصولات تازه و فاسد شدنی است (Rezaiyan, 2013). انواع پوشش‌ها به طور نسبی از نفوذ اکسیژن، جلوگیری می‌کنند و از دست رفتن رطوبت در طی نگهداری را کاهش Zahedi et al., (2010) می‌دانند. اولین بار استفاده از صمغ عربی برای افزایش طول مدت نگهداری گوجه‌فرنگی توانست گوجه‌فرنگی را تا ۲۰ روز بدون هیچ برگشت طعم یا فسادی، نگهداری کند (Sedaghat & Zahedi, 2012). این عمل از طریق پوشش‌دهی سطح قارچ با لایه نازکی از مواد پوشش‌دهنده‌ی خوارکی انجام می‌پذیرد و موجب تأخیر در بروز عالئم پیری در ماده‌غذایی و در نتیجه افزایش زمان ماندگاری آن می‌شوند. استفاده از این روش هزینه کمی دارد و می‌توان از آن برای طیف وسیعی از میوه و سبزیجات استفاده کرد، همچنین به دلیل قابلیت تجزیه‌پذیری و زیست‌تخریب‌پذیر بودن، استفاده از این نوع پوشش‌ها متداول‌تر و اقتصادی‌تر است. لیپیدها، پروتئین‌ها و پلی‌ساقاریدها موارد رایج برای استفاده در مواد پوشش‌دهنده مواد غذایی به حساب می‌آیند (Jiang, 2013).

کیتوzan (پلی-۲-آمینو-۲-دئوکسی-D-گلوکوپیرانوز) نامی برای گروهی از ترکیبات دی‌استیله شده کامل یا جزئی از کیتین است که به دلیل خواص منحصر به فردی همچون زیست‌تخریب‌پذیر بودن و غیرسمی بودن، استفاده به تنهایی یا به همراه پلی‌مرهای طبیعی دیگر مثل نشاسته و ژلاتین و آژینات در صنایع غذایی، داروسازی و دیگر صنایع، کاربردهای زیادی دارد. پلیمر کیتوzan (-poly b-(1,4)n)-acetyl-d-glucosamine که به طور صنعتی توسعه استیل زدایی شیمیایی کیتین موجود در اسکلت بیرونی بندپایان و سخت‌پوستان تولید می‌گردد، یکی از کارآمدترین موادی است که به عنوان پوشش روی میوه‌ها و سبزیجات استفاده می‌شود (Rezaiyan Attar et al., 2023). کیتوzan دارای ویژگی‌های عملکردی مانند خصوصیات ضدیکروبی و آنتی‌اسیدانی است، همچنین به عنوان فیلم خوارکی می‌تواند حامل بسیار خوبی برای ترکیب شدن با عوامل آنتی‌اسیدانی و عوامل ضدیکروبی به حساب آید (Ardean et al., 2021).

کیتوزان به مدت یک دقیقه غوطه‌ور شدند. نمونه شاهد در محلول ۰/۵ درصد اسیداستیک به مدت یک دقیقه غوطه‌ور شد. پس از آن، قارچ‌ها در دمای محیط به مدت یک ساعت با هوای آزاد خشک شدند و در انتهای رطوبت اضافی آن‌ها با دستمال گرفته شد (Jiang & Li, 2001). قارچ‌ها در کیسه‌های زیپ کیپ پلی‌اتیلنی در سایز ۱۸ در ۱۴ قرار داده شدند و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد یخچال نگهداری شدند. تیمارهای مورد بررسی در این پژوهش، به شرح [جدول ۱](#) می‌باشد.

دمای محیط هم‌زده شد تا به طور یکنواخت حل شود (Win *et al.*, 2007). پس از ۱۲ ساعت، هر نمونه به مدت ۱۵ دقیقه با دور ۶۰۰۰ درجه ۲۵ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ شد تا مواد حل نشده از آن جدا گردد (Jiang & Li, 2001). قارچ‌کمکه‌ای به صورت تازه برداشت شده، شستشو با آب و سپس رطوبت اضافی آن گرفته شد. قارچ‌ها بدون اسالیس شدن و به صورت کامل پس از سورتینگ و غربال‌گری از لحاظ اندازه و وزن تقریبی، در محلول‌های ۰/۵، ۱ و ۲ درصد

جدول ۱- کد تیمارهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر
Table 1- Code of treatments studied in current research

تیمار Treatment	کد Code
Chitosan70% decetyled-concentraion0.5% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۷۰ درصد و غلظت ۰/۵ درصد	C7-0.5
Chitosan 70% decetyled-concentraion1% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۷۰ درصد و غلظت ۱ درصد	C7-1
Chitosan 70% decetyled-concentraion2% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۷۰ درصد و غلظت ۲ درصد	C7-2
Chitosan80% decetyled-concentraion0.5% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۸۰ درصد و غلظت ۰/۵ درصد	C8-0.5
Chitosan 80% decetyled-concentraion1% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۸۰ درصد و غلظت ۱ درصد	C8-1
Chitosan 80% decetyled-concentraion2% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۸۰ درصد و غلظت ۲ درصد	C8-2
Chitosan90% decetyled-concentraion0.5% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۹۰ درصد و غلظت ۰/۵ درصد	C9-0.5
Chitosan 90% decetyled-concentraion1% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۹۰ درصد و غلظت ۱ درصد	C9-1
Chitosan 90% decetyled-concentraion2% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۹۰ درصد و غلظت ۲ درصد	C9-2
Chitosan100% decetyled-concentraion0.5% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۱۰۰ درصد و غلظت ۰/۵ درصد	C10-0.5
Chitosan 100% decetyled-concentraion1% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۱۰۰ درصد و غلظت ۱ درصد	C10-1
Chitosan 100% decetyled-concentraion2% کیتوزان با درجه استیل زدایی ۱۰۰ درصد و غلظت ۲ درصد	C10-2
Control شاهد	CT

و درصد افت وزن برای هر نمونه به صورت جداگانه محاسبه گردید (Sedaghat & Zahedi, 2012). هر نمونه دارای ۳ تکرار برای کاهش خطای آزمون است.

$$weigh loss(\%) = \frac{w_1 - w_2}{w_1} \times 100 \quad (1)$$

در این فرمول، w_1 معادل وزن اولیه نمونه و w_2 معادل وزن نمونه بعد از نگهداری است.

اندازه‌گیری افت وزنی
قارچ‌ها قبل از اعمال هرگونه تغییر اعم از پوشش‌دهی و یا شستشو، وزن کشی شدند و از این طریق تا حدودی غربال صورت گرفت. سپس تمامی نمونه‌ها بعد از پوشش‌دهی و خشک شدن وزن کشی شدند و این وزن به عنوان وزن اول یادداشت شد. وزن کشی از نمونه‌ها هر سه روز تکرار شد و وزن نمونه‌ها در روزهای اول، سوم، ششم، نهم و دوازدهم یادداشت گردید. به منظور محاسبه تغییرات وزن و اندازه‌گیری درصد افت وزنی، از [فرمول \(۱\)](#) استفاده شد

فعالیت آنزیم پراکسیداز

برای اندازه‌گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز، نمونه‌های عصاره‌گیری شده، ابتدا با دور ۵۰۰۰ و به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ شدند و سپس به ۵۰ میکرولیتر عصاره بافت، ۵ میلی‌مول گالیاکول و ۵ میلی‌مول هیدروژن پراکسید اضافه شد و جذب در طول موج ۴۷۰ نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر قرائت شد (Hu et al., 2015).

ارزیابی بافت

سنجدش بافت برای تمام نمونه‌ها در روزهای یک، شش و دوازدهم پوشش‌دهی با استفاده از دستگاه بافت‌سنجد بروکفیلد با استفاده از آزمون نفوذ با پروب استولنهای با قطر ۵ میلی‌متر با سرعت یک میلی‌متر بر ثانیه صورت گرفت.

ارزیابی حسی

برای ارزیابی حسی، از آزمون هدونیک ۵ نقطه‌ای استفاده شد و بر اساس رنگ قارچ، طعم قارچ، بو و پذیرش کلی امتیازدهی صورت گرفت. برای این منظور از ۱۰ نفر ارزیاب عادی در رد سهی ۲۰ تا ۳۰ سال دعوت شد تا در شرایط یکسان، ۱۳ نمونه را مورد ارزیابی خود قرار دهند.

تجزیه و تحلیل آماری

طراحی آزمایشات پژوهش حاضر در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار صورت پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس دوطرفه و برای مقایسه میانگین‌ها از روش آزمون دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد با استفاده از نرم‌افزار SAS نسخه ۹ استفاده شد.

نتایج و بحث

تأثیر پوشش کیتوزان بر افت وزن

قارچ خوارکی دکمه‌ای دارای مقادیر بسیار زیادی آب بوده و از رطوبت بالایی برخوردار است. از این رو در طول نگهداری قارچ خوارکی امکان از دست رفتن آب و رطوبت آن و در پی آن کاهش وزن قارچ وجود دارد که باعث کاهش مطلوبیت محصول می‌شود. پوشش‌های مورد استفاده برای محصولات به‌طور مناسبی تا حدودی از این افت وزن و از دست رفتن آب و رطوبت ماده‌غذایی جلوگیری می‌نمایند. نمونه شاهد به‌دلیل نداشتن هیچ لایه محافظی در سطح، به سرعت آب خود را از دست داده و افت وزنی در آن سریع‌تر و بیشتر اتفاق می‌افتد.

ارزیابی رنگ قارچ

برای ارزیابی رنگ قارچ از دستگاه عکس‌برداری اتماتیک هانترلب و نرم‌افزار J Image استفاده شد تا میزان فاکتورهای L^* , a^* و b^* بدست آید. سپس با استفاده از فرمول (۲) نمونه‌ها با نمونه شاهد مقایسه شد (Jiang, 2013).

$$\Delta E = (2)$$

$$\sqrt{(L^* - L_0)^2 + (a^* - a_0)^2 + (b^* - b_0)^2}$$

اندیس قهوه‌ای شدن

اندیس قهوه‌ای شدن، نشان‌دهنده خلوص رنگ قهوه‌ای است و از رابطه (۳) و (۴) بدست آمد (Lin et al., 2017)

$$BI = \frac{100 \times (x - 0.31)}{0.172} \quad (3)$$

$$x = \frac{(a + 1.75L^*)}{(5.645L^* + a^* - 3.012b^*)} \quad (4)$$

تعیین ترکیبات فنلی

برای تعیین ترکیبات فنلی کل، ابتدا ۵ گرم قارچ از هر نمونه وزن کشی و با استفاده از ازت مایع در هاون کوبیده شد و کاملاً به صورت پودر درآمد. در ادامه با ۲۰ میلی‌لیتر اتانول ۸۰ درصد ترکیب شد و به مدت ۲۴ ساعت روی شیکر با دور rpm ۱۶۰ قرار گرفت. پس از ۲۴ ساعت، تمامی نمونه‌ها با دور ۵۰۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق، سانتریفیوژ شدند و بعد با استفاده از فیلتر پارچه‌ای جداسازی صورت گرفت (Lavid et al., 2001). مقدار یک میلی‌لیتر از عصاره با یک میلی‌لیتر واکنشگر فولین سیکالتون ترکیب شد و پس از ۳ دقیقه، یک میلی‌لیتر سدیم کربنات ۷ درصد به آن افزوده شد و پس از آن به حجم ۱۰ میلی‌لیتر رسانده شد. تمامی نمونه‌ها به مدت ۹۰ دقیقه در تاریکی قرار گرفتند و سپس با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۷۵ نانومتر، جذب نمونه‌ها خوانده شد.

فعالیت آنزیمی

به‌منظور اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی، ابتدا از قارچ‌ها عصاره‌گیری انجام شد، برای این منظور، ۲ گرم قارچ با استفاده از ازت مایع در هاون کوبیده شد و سپس با ۸ میلی‌لیتر محلول بافر سدیم فسفات و EDTA ترکیب شد (Lin et al., 2017).

فعالیت آنزیم پلی‌فنل اکسیداز

نمونه‌ها پس از سانتریفیوژ با دور ۵۰۰۰ در مدت ۱۵ دقیقه، با استفاده از فیلتر پارچه‌ای همگن شدند و قسمت‌های حل نشده جدا گردید، پس از آن جذب نمونه‌ها در طول موج ۴۲۰ نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد (Sun & Song, 2003).

مانع در انتشار مواد باشد. علاوه بر این، غلظت بالای پوشش کیتوzan منجر به ایجاد یک لایه با ضخامت بالا شده و افت وزنی را کاهش می‌دهد (Rezaiyan Attar et al., 2023).

تأثیر پوشش کیتوzan بر رنگ و اندیس قهقهه‌ای شدن قارچ خوراکی

یکی از رایج‌ترین مواردی که در قارچ خوراکی دیده می‌شود، قهقهه‌ای شدن رنگ آن و از دست رفتن رنگ سفید اولیه قارچ است که این تغییر رنگ به دلیل فعالیت آنزیمی در قارچ می‌باشد. تغییر رنگ قارچ از سفید به قهقهه‌ای و ایجاد لکه‌های رنگی بر روی آن بازارپسندی محصول را پایین آورده و از کیفیت آن می‌کاهد. پوشش‌های مورد استفاده برای قارچ‌های خوراکی در درجه اول برای جلوگیری بیشتر از قهقهه‌ای شدن آنزیمی قارچ و کاهش فعالیت‌های آنزیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تیمارهایی از کیتوzan به عنوان پوشش مورد استفاده در این پژوهش، به طور مناسبی اندیس قهقهه‌ای شدن در قارچ را پایین آورده و روشنایی قارچ را بیشتر کردند. از بین تیمارهای استفاده شده، بهترین نتیجه را به ترتیب تیمارهای کیتوzan ۹۰ درصد دی‌استیله شده با غلظت ۵٪ درصد، ۹۰ درصد دی‌استیله شده با غلظت ۱ درصد، ۹۰ درصد دی‌استیله شده با غلظت ۲ درصد و ۱۰۰ درصد دی‌استیله شده با غلظت ۲ درصد از خود نشان دادند. نتایج حاصل، قابل مقایسه با الغوث و همکاران (El Ghaouth et al., 1992) در بررسی اثر پوشش کیتوzanی بر گوجه‌فرنگی و کاهش اندیس قهقهه‌ای شدن در نمونه‌های پوشش داده شده نسبت به نمونه کنترل می‌باشد (جدول ۳).

در این پژوهش، از ماده‌ی کیتوzan با ۴ درصد استیله‌زدایی و همچنین در ۳ غلظت متفاوت برای قارچ خوراکی استفاده شد و بالفاصله پس از پوشش دهی و پس از آن هر ۳ روز، وزن کشی قارچ‌های تیمار شده و تیمار نشده صورت گرفت. نتایج حاصل، حاکی از آن بود که اکثر تیمارها در مقایسه با نمونه کنترل، عملکرد خوبی را از خود نشان دادند و از افت وزنی قارچ در طول مدت نگهداری تا حد زیادی جلوگیری کردند اما مقادیر افت وزنی در هیچ‌کدام از تیمارها به صورت معنی‌دار نبود. تیمارهای کیتوzan با درجه استیله‌زدایی ۱۰۰ درصد و غلظت ۲ درصد، ۹۰ درصد استیله‌زدایی شده با غلظت ۵٪ درصد، ۹۰ درصد استیله‌زدایی شده با غلظت ۱ درصد و ۱۰۰ درصد استیله‌زدایی شده با غلظت ۵٪ درصد بهترین نتیجه را نشان دادند (جدول ۲). اثرات پوشش به عنوان یک سد نیمه تراوا در برابر O_2 ، رطوبت و حرکت املاح، در نتیجه کاهش تنفس و از دست دادن آب می‌تواند نتیجه کاهش افت وزنی در نمونه‌های پوشش داده شده باشد. نتایج پژوهش حاضر هم‌سو با مطالعات صداقت و زاهدی (Sedaghat & Zahedi, 2012) برای پوشش دهی قارچ خوراکی با صفحه عربی است. در این مقاله، پوشش دهی با صفحه عربی افت وزنی در قارچ خوراکی به دلیل افزایش آب‌گریزی و نفوذپذیری پوشش کاهش پیدا کرد و حداقل کاهش وزن مشاهده شد (Sedaghat & Zahedi, 2012).

همچنین رضائیان عطار و همکاران (Rezaiyan Attar et al., 2023) گزارش کردند که پوشش کیتوzanی در میوه پسته افت وزنی را نسبت به نمونه شاهد کاهش داد. مقادیر کمتر کاهش وزن در نمونه‌های پوشش داده شده با کیتوzan ممکن است به دلیل ایجاد یک

جدول ۲- درصد افت وزنی تیمارها
Table 2- Percentage of weight loss of treatments

تیمارها Treatments	روز سوم Day 3	روز ششم Day 6	روز نهم Day 9	روز دوازدهم Day 12
C7-0.5	0.78±0.11 ^{Hd}	1.08±0.13 ^{Kc}	1.70±0.20 ^{lb}	2.69±0.29 ^{Ga}
C7-1	1.34±0.16 ^{Dd}	1.56±0.13 ^{Ec}	1.86±0.16 ^{Gb}	2.72±0.20 ^{Fa}
C7-2	2.90±1.11 ^{Ad}	3.42±1.4 ^{Ac}	4.72±1.59 ^{Ab}	6.59±1.70 ^{Aa}
C8-0.5	0.76±0.15 ^{Jd}	1.12±0.19 ^{Ic}	1.52±0.19 ^{lb}	2.31±0.28 ^{Ia}
C8-1	1.64±0.53 ^{Cd}	2.09±0.69 ^{Cc}	2.51±0.52 ^{Cb}	3.26±0.47 ^{Ca}
C8-2	2.74±1.06 ^{Bd}	3.23±1.53 ^{Bc}	4.06±2.06 ^{Bb}	4.81±2.58 ^{Ba}
C9-0.5	0.73±0.12 ^{Kd}	1.04±0.22 ^{Lc}	1.36±0.24 ^{Lb}	1.91±0.14 ^{Ka}
C9-1	0.82±0.25 ^{Gd}	1.24±0.33 ^{Hc}	1.89±0.44 ^{Fb}	2.74±0.60 ^{Ea}
C9-2	1.09±0.46 ^{Fd}	1.70±0.75 ^{Dc}	2.09±0.64 ^{Db}	3.12±0.75 ^{Da}
C10-0.5	0.62±0.07 ^{Ld}	1.10±0.06 ^{Jc}	1.50±0.06 ^{Kb}	2.14±0.30 ^{Ja}
C10-1	1.11±0.44 ^{Ed}	1.44±0.42 ^{Fe}	1.96±0.84 ^{Eb}	2.69±1.30 ^{Ga}
C10-2	0.77±0.28 ^{Id}	1.03±0.36 ^{Mc}	1.36±0.45 ^{Lb}	1.88±0.80 ^{La}
CT	0.76±0.07 ^{Id}	1.31±0.11 ^{Ge}	1.80±0.21 ^{Hb}	2.42±0.20 ^{Ha}

* حروف کوچک مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر سطر و حروف بزرگ مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر ستون می‌باشند و همچنین حروف غیریکسان در هر ردیف و ستون به معنای تفاوت معنی‌دار است.

* Small letters are related to the comparison of averages in each row and capital letters are related to the comparison of averages in each column, and different letters in each row and column mean a significant difference.

به دلیل اینکه ترکیبات فنلی در رنگ قهقهه‌ای ایجاد شده در قارچ مؤثر هستند، هر چه میزان ترکیبات فنلی بالاتر باشد، میزان قهقهه‌ای شدن در آن کمتر خواهد بود، از این رو می‌توان ذکر کرد که ترکیبات فنلی یک عامل محدود کننده برای تغییر رنگ به حساب می‌آیند. قاسم‌نژاد و همکاران (Ghasemnezhad *et al.*, 2010) به بررسی اثر پوشش کیتوزان بر میوه زردآلو پرداختند که نتایج به دست آمده در این پژوهش نیز حاکی از حفظ ترکیبات فنلی در تیمارهای پوشش داده شده با کیتوزان بوده است (Ghasemnezhad *et al.*, 2010).

تعیین ترکیبات فنلی کل

تغییرات میزان ترکیبات فنلی کل در طی نگهداری قارچ خوارکی در مدت زمان پوشش دهی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد. قبل از نمونه‌ی شاهد، تیمارهای دیاستیل شده ۷۰ درصد با غلظت ۱ درصد و کیتوزان دیاستیل شده ۷۰ درصد با غلظت ۰/۵ درصد، بیشترین حفظ ترکیبات فنلی کل را نشان دادند و از کاهش و از دست رفتن ترکیبات فنلی جلوگیری کردند (جدول ۴).

جدول ۳- تفاوت اندیس قهقهه‌ای شدن تیمارها در طول مدت نگهداری

Table 3- difference of browning index of treatments

تیمارها Treatments	روز اول Day 1	روز ششم Day 6	روز دوازدهم Day 12
C7-0.5	87.99±0.1 ^{Kc}	112.94±0.1 ^{Eb}	115.61±0.1 ^{Fa}
C7-1	93.657±0.1 ^{Ic}	104.02±0.1 ^{Gb}	115.02±0.1 ^{Ga}
C7-2	106.89±0.1 ^{Fc}	124.35±0.1 ^{Ab}	147.48±0.1 ^{Aa}
C8-0.5	87.63±0.1 ^{Ac}	92.32±0.1 ^{Lb}	93.58±0.1 ^{La}
C8-1	101.38±0.1 ^{Gc}	116.19±0.1 ^{Bb}	138.15±0.1 ^{Ba}
C8-2	84.44±0.1 ^{Ca}	100.15±0.08 ^{Ib}	124.33±0.1 ^{Da}
C9-0.5	79.17±0.1 ^{Db}	78.72±0.1 ^{Dc}	85.47±0.1 ^{Ca}
C9-1	69.82±0.1 ^{Fc}	87.89±0.1 ^{Mb}	110.11±0.1 ^{Ia}
C9-2	99.39±0.1 ^{Hc}	102.61±0.1 ^{Hb}	111.84±0.1 ^{Ha}
C10-0.5	71.33±0.1 ^{Ec}	79.25±0.1 ^{Cb}	83.80±0.1 ^{Ea}
C10-1	93.21±0.1 ^{Jc}	107.99±0.1 ^{Fb}	130.34±0.1 ^{Ca}
C10-2	86.05±0.1 ^{Bc}	92.84±0.1 ^{Kb}	104.60±0.1 ^{Ka}
CT	87.81±0.1 ^{Lc}	93.79±0.1 ^{Jb}	108.86±0.10 ^{Ja}

* حروف کوچک مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر سطر و حروف بزرگ مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر ستون می‌باشند و همچنین حروف غیریکسان در هر ردیف و ستون به معنای تفاوت معنی‌دار است.

* Small letters are related to the comparison of averages in each row and capital letters are related to the comparison of averages in each column, and different letters in each row and column mean a significant difference.

جدول ۴- مقدادیر فنل کل در روزهای مختلف نگهداری (U.g⁻¹)Table 4- Amounts of total phenol on different days of storage (U.g⁻¹)

تیمارها Treatments	روز اول Day 1	روز ششم Day 6	روز دوازدهم Day 12
C7-0.5	0.41±0.008 ^{cM}	0.51±0.0055 ^{aC}	0.45±0.0055 ^{bEF}
C7-1	0.44±0.002 ^{bL}	0.23±0.002 ^{cD}	0.63±0.0015 ^{aA}
C7-2	0.49±0.0055 ^{bGH}	0.82±0.018 ^{baB}	0.40±0.0115 ^{cf}
C8-0.5	0.58±0.005 ^{bC}	0.91±0.053 ^{aA}	0.43±0.0045 ^{eFG}
C8-1	0.47±0.0045 ^{aJK}	0.23±0.003 ^{bD}	0.48±0.003 ^{aC}
C8-2	0.51±0.003 ^{aFG}	0.23±0.01 ^{cD}	0.44±0.0095 ^{bEFG}
C9-0.5	0.48±0.0015 ^{aHJ}	0.17±0.0015 ^{eEF}	0.46±0.007 ^{bDE}
C9-1	0.53±0.003 ^{aE}	0.16±0.001 ^{cF}	0.44±0.0015 ^{bEFG}
C9-2	0.60±0.0025 ^{aB}	0.084±0.0035 ^{cH}	0.41±0.0025 ^{bHI}
C10-0.5	0.49±0.0015 ^{aHI}	0.11±0.002 ^{cG}	0.45±0.003 ^{bEF}
C10-1	0.53±0.0025 ^{aE}	0.16±0.0015 ^{cF}	0.42±0.0015 ^{bGH}
C10-2	0.69±0.004 ^{aA}	0.18±0.008 ^{cE}	0.43±0.001 ^{bFG}
CT	0.55±0.0055 ^{aD}	0.11±0.0015 ^{bG}	0.56±0.0005 ^{aB}

حروف کوچک مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر سطر و حروف بزرگ مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر ستون می‌باشند و همچنین حروف غیریکسان در هر ردیف و ستون به معنای تفاوت معنی‌دار است.

* Small letters are related to the comparison of averages in each row and capital letters are related to the comparison of averages in each column, and different letters in each row and column mean a significant difference.

با غلظت ۱ درصد حاصل شد (جدول ۵). نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج جینگ و همکاران (Jiang et al., 2005) می‌باشد. در این مطالعه گزارش شده است که فعالیت آنزیم پلی‌فلن اکسیداز در تیمار پوشش داده شده با کیتوزان نسبت به نمونه کنترل کمتر است و این پوشش در میوه لیچی توانسته است فعالیت آنزیم پلی‌فلن اکسیداز را کنترل کند (Jiang et al., 2005).

تأثیر پوشش کیتوزان بر فعالیت آنزیم پر اکسیداز
افزایش پر اکسیداز نشان‌دهنده کاهش کیفیت ماده‌ی غذایی است. این آنزیم مسئول تغییرات مختلفی در ترکیبات شیمیایی است، به‌طوری‌که می‌تواند بر خصوصیات کیفی و فساد قارچ تأثیر بگذارد. آنزیم پر اکسیداز هم‌چنین می‌تواند بر عطر و طعم محصول اثر بگذارد (Fasidi & Kader, 1991) و سبب افت کیفیت خوراکی و تقدیمه‌ای قارچ گردد (Kadiri, 1991). به همین دلیل غیرفعال کردن یا کاهش فعالیت پر اکسیداز مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور کلی پوشش‌های خوراکی با تشکیل یک مانع حفاظت‌کننده بر سطح محصول تازه، باعث کاهش دسترسی به اکسیژن گردیده و فساد و چروکیده شدن را به تعویق می‌اندازد و سرعت آن را آهسته‌تر می‌کند. قهوه‌ای شدن‌های آنزیمی بیشتر ناشی از آنزیم‌هایی مانند پر اکسیداز است. ارتباط POD با قهوه‌ای شدن آنزیمی و دفاع آنتی‌اکسیدانی توسط تحقیقات قبلی آشکار شده است. افزایش پر اکسیداز نشانه‌ای از کاهش کیفیت محصول است و به فرآیند قهوه‌ای شدن آنزیمی مربوط می‌شود (Lin et al., 2017).

تأثیر پوشش کیتوزان بر فعالیت آنزیمی در قارچ خوراکی
اکسیداسیون فنلی در نتیجه‌های فعالیت آنزیم تیروزیناز و اکسیداسیون مونوفنل‌ها به اکسی‌دی‌فنل‌ها و سپس اکسیداسیون آن‌ها به فرم کینون و در نهایت پلیمریزه شدن خود به خودی و تولید پیگمان‌های سیاه، قرمز یا قهوه‌ای رخ می‌دهد. علاوه بر این موضوع، در نتیجه‌های پیری، غشاها سلولی پاره شده و آنزیم و سوبسترا فرصت ترکیب شدن با یکدیگر را پیدا می‌کنند و در نهایت قهوه‌ای شدن رخ می‌دهد (Ares et al., 2006).

تأثیر پوشش کیتوزان بر فعالیت آنزیم پلی‌فلن اکسیداز
غیرفعال‌سازی آنزیم پلی‌فلن اکسیداز که آنزیم اصلی مسئول قهوه‌ای شدن آنزیمی در قارچ است، با استفاده از حرارت یا استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها یا مهارکننده‌های آنزیم برای جلوگیری از قهوه‌ای شدن آنزیمی و افزایش ماندگاری قارچ برای استفاده‌های تجاری از آن، بسیار ضروری است (Luo & Barbosa-Canovas, 1996; Zhang & Flurkey, 1997). از آنجایی که هر چه مقدار آنزیم پلی‌فلن اکسیداز در قارچ بالاتر باشد، اندیس قهوه‌ای شدن نیز بالاتر می‌رود، اگر بتوان این روند را کنترل کرد، قهوه‌ای شدن قارچ کاهش پیدا خواهد کرد. بهترین نتیجه از تیمار پوشش داده شده با کیتوزان استیل زدایی شده با درصد ۹۰ و غلظت ۲ درصد، پس از آن تیمار پوشش داده شده با کیتوزان ۱۰۰ درصد دی‌استیله شده با غلظت ۰/۵ درصد و تیمار پوشش داده شده با کیتوزان ۱۰۰ درصد دی‌استیله شده

جدول ۵- مقدار آنزیم پلی‌فلن اکسیداز در طول مدت نگهداری ($\text{U.mg}^{-1}\text{protein}$)

Table 5- The amount of polyphenol oxidase enzyme during the storage period ($\text{U.mg}^{-1}\text{protein}$)

تیمارها Treatments	روز سوم Day 3	روز ششم Day 6	روز دوازدهم Day 12		
C7-0.5	0.65±0.0155 ^{cG}	1.64±0.0025 ^{aB}	1.05±0.001 ^{bF}		
C7-1	0.81±0.028 ^{cE}	0.92±0.002 ^{aJ}	0.84±0.009 ^{bH}		
C7-2	0.58±0.002 ^{cH}	1.35±0.011 ^{bE}	1.90±0.0045 ^{aA}		
C8-0.5	0.85±0.0025 ^{cD}	1.75±0.0105 ^{aA}	1.04±0.024 ^{bF}		
C8-1	0.59±0.019 ^{cH}	1.00±0.0015 ^{bH}	1.25±0.002 ^{aC}		
C8-2	0.46±0.001 ^{cI}	1.17±0.0035 ^{aF}	1.10±0.0095 ^{bE}		
C9-0.5	0.66±0.0115 ^{cG}	0.93±0.008 ^{aIJ}	0.84±0.006 ^{bHI}		
C9-1	0.89±0.001 ^{cC}	1.14±0.004 ^{bG}	1.18±0.0015 ^{aD}		
C9-2	0.74±0.001 ^{bF}	1.18±0.026 ^{aF}	0.67±0.0235 ^{cJ}		
C10-0.5	1.06±0.0095 ^{bB}	1.61±0.0045 ^{aC}	1.04±0.0255 ^{bF}		
C10-1	1.21±0.0395 ^{bA}	1.60±0.007 ^{aC}	0.95±0.006 ^{cG}		
C10-2	0.82±0.001 ^{cE}	1.38±0.001 ^{bD}	1.57±0.003 ^{aB}		
CT	0.85±0.0035 ^{bD}	1.15±0.0005 ^{aFG}	1.18±0.015 ^{aD}		

* حروف کوچک مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر سطر و حروف بزرگ مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر ستون می‌باشد و همچنین حروف غیربکسان در هر ردیف و ستون به معنای تفاوت معنی‌دار است.

* Small letters are related to the comparison of averages in each row and capital letters are related to the comparison of averages in each column, and different letters in each row and column mean a significant difference.

جدول ۶- مقادیر آنزیم پراکسیداز در طی مدت نگهداری (U.mg⁻¹protein)
Table 6- Peroxidase enzyme levels during the storage period (U.mg⁻¹protein)

Treatments	تیمارها	روز اول	روز دوازدهم
		Day 1	Day 12
C7-0.5	1.03±0.0325 ^{aDE}	0.80±0.0015 ^{bl}	
C7-1	0.57±0.0065 ^{bl}	0.87±0.01 ^{aH}	
C7-2	0.87±0.0435 ^{aF}	0.67±0.0015 ^{bJ}	
C8-0.5	0.65±0.1005 ^{bH}	1.04±0.0015 ^{aF}	
C8-1	0.51±0.001 ^{bJ}	0.99±0.0005 ^{aG}	
C8-2	0.88±0.0015 ^{bF}	1.23±0.0045 ^{aD}	
C9-0.5	1.17±0.049 ^{bB}	1.25±0.002 ^{aD}	
C9-1	0.70±0.0225 ^{bH}	1.36±0.002 ^{aC}	
C9-2	0.52±0.0095 ^{bJ}	0.87±0.001 ^{aH}	
C10-0.5	0.79±0.0435 ^{bG}	1.40±0.0065 ^{aB}	
C10-1	1.08±0.05 ^{bC}	1.68±0.011 ^{aA}	
C10-2	0.91±0.035 ^{bF}	1.12±0.008 ^{aE}	
CT	1.41±0.002 ^{aA}	1.39±0.0015 ^{aBC}	

* حروف کوچک مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر سطر و حروف بزرگ مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر ستون می‌باشد و همچنین حروف غیریکسان در هر ردیف و ستون به معنای تفاوت معنی‌دار است.

* Small letters are related to the comparison of averages in each row and capital letters are related to the comparison of averages in each column, and different letters in each row and column mean a significant difference.

و سختی اولیه‌ی قارچ در نمونه شاهد در طی ۱۲ روز با اختلاف زیادی از روز اول مشاهده شد. تیمارهای پوشش‌دهی شده اکثراً در حفظ سفتی بافت، بهتر عمل کرده و توانستند حالت‌های بافتی را تا حدودی در طی مدت نگهداری حفظ کنند. تفاوت سختی بافت در تیمار پوشش‌دهی شده با کیتوzan ۷۰ درصد استیل زدایی شده با غلظت ۲ درصد بهترین عملکرد را بین تیمارها نشان داد و تفاوت معناداری بین سختی بافت در روز اول و روز ششم و روز دوازدهم وجود نداشت. پس از آن، تیمار کیتوzan با درجه استیل زدایی ۷۰ درصد با غلظت ۵/۰ درصد نیز نتایج تقریباً قابل قبولی داشت، در این تیمار، میزان سفتی قارچ در روز ششم بیشتر از روز اول بود اما تا روز دوازدهم این مقدار کاهش پیدا کرد و تقریباً به میزان سفتی روز اول نزدیک شد و تفاوت معنی‌داری بین سفتی بافت در روز اول و روز دوازدهم مشاهده نشد (جدول ۷). صداقت و همکاران (2012) در مطالعه‌ای، قارچ خوارکی را با امولسیون صمغ عربی پوشش دادند و نتیجه حاصل را چنین گزارش کردند که در طول نگهداری قارچ، در دمای ۷ درجه سانتی‌گراد، در ۴ روز اول سختی افزایش پیدا کرد و رسیدگی قارچ پس از آن باعث از دست دادن سفتی شد، میزان از دست دادن سفتی قارچ در تیمارهای بدون پوشش ۳۹ درصد و در تیمارهای پوشش داده شده ۲۱ درصد بوده است (Sedaghat & Zahedi, 2012).

(Zahedi, 2012)

رضاییان عطار و همکاران (Rezaiyan Attar et al., 2023) نیز در مطالعه‌ای به بررسی اثر پوشش کیتوzan بر میوه پسته پرداختند که نتایج حاصل، نشان‌دهنده تأثیر این پوشش بر حفظ سفتی بافت محصول در طول نگهداری بوده است.

هر چه آنزیم پراکسیداز در روز دوازدهم کمتر از روز اول باشد، نتیجه بهتری حاصل می‌شود. تیمار پوشش داده شده با کیتوzan ۷۰ درصد و غلظت ۵/۰ درصد در درجه اول بهترین عملکرد را داشته، پس از آن تیمار پوشش داده شده با کیتوzan ۷۰ درصد با غلظت ۲ درصد، میزان آنزیم پراکسیداز را در قارچ‌ها کاهش داد. نمونه‌ی شاهد اختلاف معنی‌داری در روز اول و روز دوازدهم نشان نداد (جدول ۶). در مطالعه‌ی صورت گرفته توسط یووی و همکاران Youwei & Yinzhe, 2013)، پوشش‌دهی انگور با کیتوzan، توانسته است فعالیت آنزیم پراکسیداز را در محصول تا حد مناسبی کنترل نماید (Youwei & Yinzhe, 2013). نتایج این پژوهش قابل مقایسه با پژوهش حاضر می‌باشد که نشان‌دهنده کنترل و حفظ بیشتر آنزیم پراکسیداز در تیمار پوشش داده شده نسبت به نمونه شاهد بوده است.

تأثیر پوشش کیتوzan بر بافت و سفتی قارچ خوارکی بافت یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اندازه‌گیری کیفیت در محصولات است. برای قارچ خوارکی دکمه‌ای نیز بافت یکی از اساسی‌ترین ملاک‌های ارزیابی می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی تغییرات متابولیکی در قارچ می‌باشد (Gao et al., 2014).

سفتی بافت

یکی از اهداف پوشش‌دهی قارچ خوارکی، حفظ حالت‌های اولیه‌ی بافت قارچ می‌باشد. سفتی بافت قارچ با دستگاه بافت‌سنجد در طی ۱۲ روز اندازه‌گیری شد و میزان سفتی قارچ در روزهای اول، ششم و دوازدهم با نمونه شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. از دست رفتن سفتی

جدول ۷- میزان سفتی بافت در روزهای مختلف آزمایش (g)

Table 7- The degree of hardness on different days of the test (g)

تیمارها Treatments	روز اول Day 1	روز ششم Day 6	روز دوازدهم Day 12
C7-0.5	2092±732 ^{Hab}	2390±39 ^{FGa}	1403±294 ^{EFGB}
C7-1	3888.5±605.5 ^{BCa}	3009.5±1.5 ^{BEB}	1759±61 ^{DEFc}
C7-2	3097±191 ^{DG} a	2413±398 ^{FGa}	2696±593 ^{ABCa}
C8-0.5	2890±751 ^{DGF} a	2868±349 ^{CEFa}	1165.5±151.5 ^{FGHb}
C8-1	3816.5±662.5 ^{BCD} a	2960.5±412.5 ^{CEFB} b	1217±192 ^{FGHc}
C8-2	3607.5±78.5 ^{CDE} a	3364±854 ^{ABA} a	2300±355 ^{BCD} b
C9-0.5	3200±750 ^{CDEF} a	2550±78 ^{CEFa}	873±77 ^{Hb}
C9-1	3315±346 ^{CDE} a	2438±144 ^{EFGB} b	1193.5±445.5 ^{FGHc}
C9-2	3920.5±425.5 ^{BC} a	3572.5±232.5 ^{ABA} a	1654±612 ^{DEFG} b
C10-0.5	3793.5±73.5 ^{BCD} a	2556.5±66.5 ^{CEFB} b	1315.5±45.5 ^{FGHc}
C10-1	4501±241 ^{ABA} a	2815.5±48.5 ^{CEFB} b	2059±44 ^{CDE} c
C10-2	3714±172 ^{CDE} a	3176±147 ^{BDE} a	999.5±378.5 ^{GHb}
CT	4680±377 ^{Aa}	2836.5±529.5 ^{DEFB} b	1294.5±80.5 ^{FGHc}

* حروف کوچک مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر سطر و حروف بزرگ مربوط به مقایسه میانگین‌ها در هر ستون می‌باشد و همچنین حروف غیریکسان در هر ردیف و ستون به معنای تفاوت معنی‌دار است.

* Small letters are related to the comparison of averages in each row and capital letters are related to the comparison of averages in each column, and different letters in each row and column mean a significant difference.

کیتوzan ۹۰ درصد استیل زدایی شده با غلظت یک درصد بود و این تیمار با تیمارهای پوشش داده شده با کیتوzan استیل زدایی شده با درصد های ۸۰ با غلظت ۵/۰ درصد و ۱۰۰ درصد با غلظت ۵/۰ درصد تفاوت معنی‌داری نداشت. به مرتبه بقیه تیمارها نمره‌های کمتری دریافت کردند. به طور کلی بهترین نتیجه در آزمون حسی از تیمار پوشش داده شده با کیتوzan ۹۰ درصد با غلظت ۱ درصد دریافت شد (Chien et al., 2007) بوده است، چنان‌که پوشش کیتوzan توانسته است طعم و مزه، ویژگی‌های حسی و رنگ انبه را در طول مدت نگهداری حفظ کند و قهقهه‌ای شدن را به تأخیر بیاندازد (Chien et al., 2007).

نتیجه‌گیری

فساد قارچ خوارکی در طول مدت زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد و نگهداری از قارچ در مدت زمان طولانی‌تر به یکی از موارد مهم در تولید قارچ تبدیل شده است. پوشش دهنده قارچ خوارکی یکی از روش‌های مناسب جهت افزایش زمان ماندگاری قارچ خوارکی است. در این پژوهش از کیتوzan با چهار درجه استیل زدایی ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۱۰۰ درصد با سه غلظت (۵/۰، ۱ و ۲ درصد) به عنوان پوشش قارچ خوارکی استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که تمام تیمارهای پوشش دهنده کیتوzan توانستند موجب تأخیر در بروز فساد و تغییر رنگ یا بافت آن شوند. بهترین تیمار، کیتوzan با درجه استیل زدایی ۷۰ درصد در حفظ مقادیر فنل کل، کنترل فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان سفتی قارچ در طول نگهداری بوده است، در کنترل افت وزنی، فعالیت آنزیم پلی‌فنل اکسیداز و آزمون حسی، تیمار کیتوzan با درجه

کاهش تعرق و بهبود احتباس آب، پس از اعمال پوشش کیتوzan، باعث حفظ رطوبت و در پی آن، بافت محصول می‌شود. یکی دیگر از دلایل تأخیر نرم شدن ممکن است کاهش تنفس میوه‌های پوشش داده شده با کیتوzan باشد (Rezaiyan Attar et al., 2023).

آزمون حسی

در ارزیابی رنگ قارچ‌های تست شده در آزمون حسی، بهترین رنگ از نظر ارزیابها متعلق به تیمار کیتوzan با درجه استیل زدایی ۹۰ درصد با غلظت یک درصد بود و پس از آن تیمار کیتوzan با استیل زدایی ۱۰۰ درصد با غلظت ۵/۰ درصد بالاترین نمره را در تست هدونیک دریافت کرد. بین تیمارهای کیتوzan با درجه استیل زدایی ۱۰۰ درصد و غلظت ۵/۰ درصد با تیمارهای کیتوzan با درجه استیل زدایی ۸۰ درصد با غلظت ۵/۰ درصد، بهترین ۱۰۰ درصد با غلظت ۲ درصد و شاهد تفاوت معنی‌دار نیست. به طور کلی از نظر رنگ، بهترین نتیجه را تیمار پوشش داده شده با کیتوzan ۹۰ درصد و غلظت ۱ درصد داشت. از لحاظ طعم، تمامی تیمارهای پوشش داده شده نمره قابل قبولی از ارزیابها دریافت کرد، با اختلاف زیادی طعم تیمارهای پوشش داده با کیتوzan از نمونه‌ی شاهد بهتر و مورد قبول برای ارزیابها بود. نتایج ارزیابی حسی بروای تمامی نمونه‌ها تقریباً یکسان بود و تفاوت معنی‌داری بین آنها وجود نداشت به جز نمونه‌ی ۷۰ پوشش داده شده با کیتوzan درصد استیل زدایی شده با غلظت ۲ درصد که از درجه پذیرش کمتری برخوردار بود. از ارزیابها خواسته شد تا به هر نمونه به طور کلی امتیاز دهند و درجه پذیرش کلی خود را اعلام کنند. بهترین نمونه از نظر ارزیابها، تیمار پوشش داده شده با

مواردی همچون کنترل وزن یا موارد حسی مورد نظر باشد، بهتر است از تیمارهای ۹۰ و ۱۰۰ درصد استیل زدایی شده استفاده شود. بدلیل خواص ضد میکروبی بسیار قوی کیتوزان، پیشنهاد می‌شود که باز میکروبی قارچ خوارکی دکمه‌ای پوشش داده شده، بررسی شود، هم‌چنین دیگر فاکتورهای بافتی قارچ، مثل خاصیت صمغینگی، خاصیت چسبندگی و انسجام نیز می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد.

استیل زدایی ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد نتیجه بهتری داشتهند و از نظر اندیس قهوه‌ای شدن و بافت، تیمار کیتوزان با درجه استیل زدایی ۸۰ درصد عملکرد مناسب‌تری از خود نشان داده است. بدلیل تفاوت عملکردی انواع پوشش‌های استفاده شده، پیشنهاد می‌شود که با توجه به نیاز، از یکی از انواع پوشش‌دهی استفاده شود، چنان‌که برای مواردی که رنگ و بافت قارچ خوارکی بیشتر مدنظر باشد، بهتر است از تیمار کیتوزان با درجه استیل زدایی ۸۰ درصد استفاده گردد و چنانچه

جدول ۸- ارزیابی حسی بر اساس طعم و مزه، رنگ، بو و پذیرش کلی

Table 8- Sensory evaluation based on taste, color, odor and total acceptability

Treatments	تیمارها	رنگ	مزه	بو	پذیرش کلی
	Color	Flavor	Smell		Total Acceptability
C7-0.5	2.6±1.07 ^{ED}	4.8±0.42 ^A	4.9±0.31 ^A		3.6±0.69 ^{EF}
C7-1	3.1±0.73 ^{DC}	4.9±0.31 ^A	4.7±0.48 ^A		4.1±0.56 ^{CDE}
C7-2	2±0.81 ^E	4.7±0.48 ^A	4.2±1.03 ^B		3.3±0.48 ^F
C8-0.5	4±0.47 ^{BC}	4.9±0.31 ^{AB}	4.9±0.31 ^A		4.6±0.51 ^{ABC}
C8-1	3.2±0.63 ^{DC}	4.9±0.31 ^A	4.8±0.63 ^A		4±0.47 ^{DE}
C8-2	2.8±1.13 ^{ED}	4.8±0.42 ^A	4.7±0.48 ^A		3.9±0.73 ^{DE}
C9-0.5	3.3±1.15 ^{DC}	4.9±0.31 ^A	4.9±0.31 ^A		4.2±0.63 ^{BCD}
C9-1	4.9±0.31 ^A	4.9±0.31 ^A	4.9±0.31 ^A		4.9±0.31 ^A
C9-2	3.2±1.13 ^{DC}	4.9±0.31 ^A	4.5±0.97 ^{AB}		4.1±0.73 ^{CDE}
C10-0.5	4.6±0.69 ^{AB}	4.9±0.31 ^A	4.9±0.31 ^A		4.7±0.48 ^{AB}
C10-1	3.4±1.17 ^{DC}	4.9±0.31 ^A	4.9±0.31 ^A		4.2±0.63 ^{BCD}
C10-2	3.8±0.63 ^{BC}	4.9±0.31 ^A	4.7±0.48 ^A		4.2±0.42 ^{BCD}
CT	3.8±0.91 ^{BC}	4.4±0.69 ^B	4.9±0.31 ^A		4.3±0.67 ^{BCD}

*حروف غیر یکسان در هر ستون به معنای تفاوت معنادار می‌باشد.

* Different letters in each column mean a significant difference.

References

1. Ares, G., Carina P., Gámbaro, A., Lareo C., & Lema, P. (2006). Sensory shelf life of shiitake mushrooms stored under passive modified atmosphere. *Postharvest Biology and Technology*, 41, 191-97. <https://doi.org/10.3390/ijms22147449>
2. Beaulieu, M., Aprano, G.D., & Lacroix, M. (2002). Effect of dose rate of gamma irradiation on biochemical quality and browning of mushrooms *Agaricus bisporus*. *Radiation Physics and Chemistry*, 63, 311-15. [https://doi.org/10.1016/S0969-806X\(01\)00518-7](https://doi.org/10.1016/S0969-806X(01)00518-7)
3. Bozena, M., Kala, K., Rojowski, J., Grzywacz, A., & Opoka, W. (2017). Composition and biological properties of *Agaricus bisporus* fruiting bodies-a review. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 67. <https://doi.org/10.1515/pjfn-2016-0032>
4. Chien, P.J., Sheu, F., & Yang, F.H. (2007). Effects of edible chitosan coating on quality and shelf life of sliced mango fruit. *Journal of Food Engineering*, 78(1), 225-229. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.09.022>
5. Cristina, A., Davidescu, C.M., Nemeş, N.S., Negrea, A., Ciopec, M., Duteanu, N., Negrea, P., Duda-Seiman, D., & Musta, V. (2021). Factors influencing the antibacterial activity of chitosan and chitosan modified by functionalization. *International Journal of Molecular Sciences*, 22, 7449. <https://doi.org/10.3390/ijms22147449>
6. El Ghaouth, A., Ponnapallam, R., Castaigne, F., & Arul, J. (1992). Chitosan coating to extend the storage life of tomatoes. *HortScience*, 27(9), 1016-1018. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.27.9.1016>
7. Eliezer, L., Villalobos-Carvajal, R., Reyes-Parra, J., Jara-Quijada, E., Ruiz, C., Andrade, P., Gacitúa, J., & Beldarraín-Iznaga, T. (2021). Preservation of mushrooms (*Agaricus bisporus*) by an alginate-based-coating containing a cinnamaldehyde essential oil nanoemulsion. *Food Packaging and Shelf Life*, 28, 100662. <https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2021.100662>
8. Fasidi, I.O., & Kadiri, M. (1991). Changes in enzyme activities of *Termitomyces robustus* (Beli) Heim and *Lentinus subnudus* Berk during sporophore development. *Food Chemistry*, 39, 109-16. [https://doi.org/10.1016/0308-8146\(91\)90089-7](https://doi.org/10.1016/0308-8146(91)90089-7)
9. Gantner, M., Dominika, G., Pogorzelska, E., Brodowska, M., Wojtasik-Kalinowska, I., & Godziszewska, J. (2017). The effect of film type and modified atmosphere packaging with different initial gas composition on the shelf life

- of white mushrooms (*Agaricus bisporus* L.). *Journal of Food Processing and Preservation*, 41, e13083. <https://doi.org/10.1111/jfpp.13083>
10. Ghasemi-Varnamkhasti, M., Mohammad-Razdari, A., Yoosefian, S.H., & Izadi, Z. (2018). Effects of the combination of gamma irradiation and Ag nanoparticles polyethylene films on the quality of fresh bottom mushroom (*Agaricus bisporus* L.). *Journal of Food Processing and Preservation*, 42, e13652. <https://doi.org/10.1111/jfpp.13652>
 11. Ghasemnezhad, M., Shiri, M.A., & Sanavi, M. (2010). Effect of chitosan coatings on some quality indices of apricot (*Prunus armeniaca* L.) during cold storage. *Caspian Journal of Environmental Sciences*, 8(1), 25-33.
 12. Hong Kyoong, N., Young Park, N., Lee, S.H., & Meyers S.P. (2002). Antibacterial activity of chitosans and chitosan oligomers with different molecular weights. *International Journal of Food Microbiology*, 74, 65-72. <https://doi.org/10.1177/1082013211433075>
 13. Jiang, Y., Li, J., & Jiang, W. (2005). Effects of chitosan coating on shelf life of cold-stored litchi fruit at ambient temperature. *LWT-food Science and Technology*, 38(7), 757-761. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2004.09.004>
 14. Jing, L., Li, B., Zhang, N., Yan, R., Guan, W., Brennan, C.S., Gao, H., & Peng, B. (2018). Effects of UV-C treatment on browning and the expression of polyphenol oxidase (PPO) genes in different tissues of *Agaricus bisporus* during cold storage. *Postharvest Biology and Technology*, 139, 99-105. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2017.11.022>
 15. Kompal, J., Warby, J., Valverde, J., Tiwari, B., Cullen, P.J., & Frias, J.M. (2018). Impact of cold chain and product variability on quality attributes of modified atmosphere packed mushrooms (*Agaricus bisporus*) throughout distribution. *Journal of Food Engineering*, 232, 44-55. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2018.03.019>
 16. Luo, Y., & Barbosa-Canovas, GV. (1996). Preservation of apple slices using ascorbic acid and 4-hexylresorcinol/Preservación de rodaj as de manzana con ácido ascórbico y 4-hexilresorcinol', *Food Science and Technology International*, 2, 315-21. <https://doi.org/10.1177/108201329600200505>
 17. Mengsha, G., Feng, L., & Jiang, T. (2014). Browning inhibition and quality preservation of button mushroom (*Agaricus bisporus*) by essential oils fumigation treatment. *Food Chemistry*, 149, 107-13. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.10.073>
 18. Nasiri, M., Barzegar, M., Sahari, M.A., & Niakousari, M. (2018). Application of Tragacanth gum impregnated with Satureja khuzistanica essential oil as a natural coating for enhancement of postharvest quality and shelf life of button mushroom (*Agaricus bisporus*). *International Journal of Biological Macromolecules*, 106, 218-26. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.003>
 19. Noa, L., Barkay, Z., & Tel-Or, E. (2001). Accumulation of heavy metals in epidermal glands of the waterlily (Nymphaeaceae). *Planta*, 212, 313-22. <https://doi.org/10.1007/s004250000399>
 20. Pavel, K. (2013). A review of chemical composition and nutritional value of wild-growing and cultivated mushrooms. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 93, 209-18. <https://doi.org/10.1002/jsfa.5960>
 21. Qiong, L., Lu, Y., Zhang, J., Liu, W., Guan, W., & Wang, Z. (2017). Effects of high CO₂ in-package treatment on flavor, quality and antioxidant activity of button mushroom (*Agaricus bisporus*) during postharvest storage. *Postharvest Biology and Technology*, 123, 112-18. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2016.09.006>
 22. Rezaiyan Attar, F. (2022). Modeling the respiration rate of chitosan coated fresh in-hull pistachios (*Pistacia vera* L. cv. Badami) for modified atmosphere packaging design. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 16(2), 1049-1061. <https://doi.org/10.1007/s11694-021-01235-8>
 23. Rezaiyan Attar, F. (2023). Modified atmosphere packaging with chitosan coating to prevent deterioration of fresh in-hull Badami's pistachio fruit. *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, 10(1), 1-18. <https://doi.org/10.1186/s40538-023-00393-9>
 24. Sedaghat, N., & Zahedi, Y. (2012). Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (*Agaricus bisporus*). *Food Science and Technology International*, 18, 523-30. <https://doi.org/10.1177/1082013211433075>
 25. Sudarshan, N.R., Hoover, D.G., & Knorr, D. (1992). Antibacterial action of chitosan. *Food Biotechnology*, 6, 257-72. <https://doi.org/10.1080/08905439209549838>
 26. Sun, N.K., & Song, K.B. (2003). Effect of nonthermal treatment on the molecular properties of mushroom polyphenoloxidase. *Journal of Food Science*, 68, 1639-43. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2003.tb12305.x>
 27. Tianjia, J. (2013). Effect of alginate coating on physicochemical and sensory qualities of button mushrooms (*Agaricus bisporus*) under a high oxygen modified atmosphere'. *Postharvest Biology and Technology*, 76, 91-97. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2012.09.005>
 28. Tianjia, J., Luo, Z., & Ying, T. (2015). Fumigation with essential oils improves sensory quality and enhanced antioxidant ability of shiitake mushroom (*Lentinus edodes*). *Food Chemistry*, 172, 692-98. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.09.130>

29. Usman, M., Ghulam M., & Allah, D. (2021). Nutritional, medicinal, and cosmetic value of bioactive compounds in button mushroom (*Agaricus bisporus*): a review. *Applied Sciences*, 11, 5943. <https://doi.org/10.3390/app11135943>
30. Weijn, A., Tomassen, M.M.M., Bastiaan-Net, S., Eahj Hendrix, J.J.P., Baars, A.S.M., Sonnenberg, H.J., Wicher, & Mes, J.J. (2011). Browning sensitivity of button mushrooms. In Proceedings of the 7th international conference on mushroom biology and mushroom products, 203-11.
31. Win, N., Kyu Kyu, P., Jitareerat, S., Kanlayanarat, & Sangchote, S. (2007). Effects of cinnamon extract, chitosan coating, hot water treatment and their combinations on crown rot disease and quality of banana fruit. *Postharvest Biology and Technology*, 45, 333-40. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2007.01.020>
32. Xinling, W., Guan, W., Yan, R., Lei, J., Xu, L., & Wang, Z. (2016). Effects of UV-C on antioxidant activity, total phenolics and main phenolic compounds of the melanin biosynthesis pathway in different tissues of button mushroom. *Postharvest Biology and Technology*, 118, 51-58. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2016.03.017>
33. Xu, Y.X., Myong Kim, K., Hanna, M.A., & Nag, D. (2005). Chitosan–starch composite film: preparation and characterization. *Industrial Crops and Products*, 21, 185-92. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2004.03.002>
34. Xiaohui, L., & Sun, D.W. (2019). Research advances in browning of button mushroom (*Agaricus bisporus*): Affecting factors and controlling methods. *Trends in Food Science & Technology*, 90, 63-75. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.05.007>
35. Yong-Hua, H., Chen, C.M., Xu, L., Cui, Y., Yu, X.Y., Gao, H.J., Wang, Q., Liu, K., Shi, Y., & Chen, Q.X. (2015). Postharvest application of 4-methoxy cinnamic acid for extending the shelf life of mushroom (*Agaricus bisporus*). *Postharvest Biology and Technology*, 104, 33-41. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2015.03.007>
36. Youwei, Y., & Yinzhe, R. (2013). Grape preservation using chitosan combined with β-Cyclodextrin. *International Journal of Agronomy*. <https://doi.org/10.1155/2013/209235>
37. Yueming, J., & Li, Y. (2001). Effects of chitosan coating on postharvest life and quality of longan fruit. *Food Chemistry*, 73, 139-43. [https://doi.org/10.1016/S0308-8146\(00\)00246-6](https://doi.org/10.1016/S0308-8146(00)00246-6)
38. Zahedi, Y., Ghanbarzadeh, B., & Sedaghat, N. (2010). Physical properties of edible emulsified films based on pistachio globulin protein and fatty acids. *Journal of Food Engineering*, 100, 102-08. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.03.033>
39. Zhang, K., Yuan-Yuan P., & Sun, D.W. (2018). Recent advances in quality preservation of postharvest mushrooms (*Agaricus bisporus*): A review. *Trends in Food Science & Technology*, 78, 72-82. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.05.012>
40. Zhang, X., & Flurkey, W.H. (1997). Phenoloxidases in Portabella mushrooms. *Journal of Food Science*, 62, 97-100. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1997.tb04376.x>