



## Pre-harvest Application of Chitosan with Carvacrol on Biochemical, Qualitative and Shelf Life Characteristics of Strawberry (*Fragaria × ananassa* Duch.)

Z. Ghasemi Arshad<sup>1</sup>, A. Ehtesham Nia<sup>2\*</sup>, E. Hazbawi<sup>3</sup>, H. Mumivand<sup>4</sup>, M. Soleimani Aghdam<sup>5</sup>

1, 2 and 4- M.Sc. and Associate Professors, Department of Horticultural Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran, respectively.

(\*- Corresponding Author Email: [Ehteshamnia.ab@lu.ac.ir](mailto:Ehteshamnia.ab@lu.ac.ir))

3- Assistant Professor, Department of Biosystem, Lorestan University, Khorramabad, Iran

5- Associate Professor, Department of Horticultural Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

### How to cite this article:

Received: 2022.07.21  
Revised: 2023.01.29  
Accepted: 2023.02.14  
Available Online: 2023.02.19

Ghasemi Arshad, Z., Ehtesham Nia, A., Hazbawi, E., Mumivand, H., & Soleimani Aghdam, M. (2023). Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on biochemical, qualitative and shelf life characteristics of strawberry (*Fragaria × ananassa* Duch). *Iranian Food Science and Technology Research Journal*, 19(5), 617-633. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22067/ifstrj.2023.77806.1192>

### Introduction

The increase in people's awareness of the negative effects of chemical preservatives has led to more research on the antimicrobial effect of plant essential oils and their potential to be used as preservative compounds. Strawberry (*Fragaria ananassa* cv. qingxiang) is one of the most popular and widely consumed berries due to its taste, sweetness and healthy function. The taste of strawberry is related to its hardness, viscosity, sugars, protein, total soluble solid, titratable acidity content and minerals like P, K, Ca and Fe. It is a good source of polyphenolic compounds such as flavanols and has antioxidant activity. This, together with higher vitamin C content in strawberries, contributes beneficial effects on the maintenance of consumer health. Strawberry has higher antioxidant activities than orange, grape, banana, apple, etc. Strawberries are among the fruits sensitive to mechanical and physiological damage and have a fast metabolism and deterioration during the storage period. For this reason, it is necessary to use safe methods to control spoilage and maintain the quality of strawberry fruit during storage.

### Materials and Methods

The experiment was conducted in a completely randomized design, in a 5 x 4 factorial scheme (5 treatments x 4 periods evaluated), with four replications. The first variable was the type of material with different concentrations in five levels including 0, 0.3%, 0.6% carvacrol, the combination of chitosan with 0.3% and 0.6% carvacrol, and the second variable was storage time in four periods including 0, 10, 20, 30 days of storage. The harvested fruits were kept at 4°C and with a relative humidity of 90±5% and parameters such as weight loss, pH, firmness of the fruit tissue, acidity (TA), soluble solids (TSS) and taste index, vitamin C, phenol and flavonoid, fruit shelf life (number of days) during the storage period were investigated and studied.

### Results and Discussion

The ANOVA results showed that the effect of the type of treatment and storage time on all investigated traits except for the firmness of the fruit texture was significant at the probability level of 1%. The fruits treated with the combination of chitosan and carvacrol 0.6% had more texture firmness, vitamin C, total phenol content and the amount of soluble solids and better shelf life than the control. In all four storage times, the highest content of total phenol (2.49 mg of gallic



©2023 The author(s). This is an open access article distributed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

<https://doi.org/10.22067/ifstrj.2023.77806.1192>

acid per 100 gr FW), total flavonoid (0.435 mg of Quercetin per 100 gr FW) and firmness (3.80 N) was related to the combined treatment of chitosan with carvacrol 0.6% and the lowest amount was related to the control. The firmness of the fruit tissue gradually decreased during storage, but this process was observed at a significantly slower rate in the treated fruits.

### **Conclusion**

Considering the increase of 10 and 12 days of shelf life post-harvest of the combined treatment of chitosan + 0.6% carvacrol compared to other treatments and the control, hence the application of chitosan pre-harvest and the use of 0.6% carvacrol edible coatings can be recommended as a safe and low-cost strategy to increase the shelf life post-harvesting of 'Parus' strawberry cultivar.

**Keywords:** Carvacrol, Edible coating, Firmness of fruit texture, Shelf life, Vitamin C



## مقاله پژوهشی

جلد ۱۹، شماره ۵، آذر- دی ۱۴۰۲، ص. ۶۳۳-۶۱۷

# کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرویل بر خصوصیات بیوشیمیایی، کیفی و ماندگاری توت فرنگی (*Fragaria × ananassa* Duch.)

زینب قاسمی ارشد<sup>۱</sup> - عبدالله احتشام‌نیا<sup>۲\*</sup> - عیسی حزباوی<sup>۳</sup> - حسن مومیوند<sup>۴</sup> - مرتضی سلیمانی اقدم<sup>۵</sup>

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

### چکیده

بالا رفتن سطح آگاهی مردم نسبت به اثرات منفی نگهدارنده‌های شیمیایی، منجر به انجام تحقیقات بیش‌تر در زمینه پوشش‌های طبیعی، زیست‌تخریب‌پذیر با خاصیت ضد میکروبی شده است. این پژوهش، به‌صورت آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه آموزشی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. فاکتور اول، نوع مواد با غلظت‌های مختلف در پنج سطح شامل صفر (شاهد)، کارواکرویل ۰/۳ درصد، کارواکرویل ۰/۶ درصد، ترکیب کیتوزان ۱/۵ درصد با کارواکرویل ۰/۳ درصد و ترکیب کیتوزان ۱/۵ درصد با کارواکرویل ۰/۶ درصد و فاکتور دوم زمان انبارمانی در چهار سطح شامل صفر، ۱۰، ۲۰، ۳۰ روز پس از انبارمانی بود. میوه‌های برداشت شده در دمای ۴±۰/۵ درجه سانتی‌گراد، با رطوبت نسبی ۹۰±۵ درصد نگهداری شدند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تاثیر نوع تیمار و مدت زمان انبارمانی بر تمام صفات مورد بررسی به‌جز سفتی بافت میوه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. میوه‌های تیمار شده با ترکیب کیتوزان و کارواکرویل ۰/۶ درصد سفتی بافت، ویتامین‌ث، مواد فنولی و مقدار مواد جامد محلول بیش‌تر و ماندگاری بهتری نسبت به شاهد داشتند. به‌طوری‌که بالاترین میزان محتوای فنل کل (۲/۴۹ میلی‌گرم اسیدگالیک در ۱۰۰ گرم وزن تر) و سفتی بافت (۳/۸۰ کیلوگرم نیرو) مربوط به تیمار ترکیبی کیتوزان با کارواکرویل ۰/۶ درصد بود. نتایج این مطالعه نشان داد کاربرد قبل از برداشت کیتوزان و کارواکرویل ۰/۶ درصد می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ایمن و کم هزینه جهت افزایش عمر پس از برداشت توت‌فرنگی رقم 'پاروس' قابل توصیه باشد.

**واژه‌های کلیدی:** پوشش خوراکی، سفتی بافت میوه، کارواکرویل، ماندگاری، ویتامین‌ث

### مقدمه

(Mozafari et al., 2018). همه‌ی این ترکیبات اثر هم‌افزایی و تجمعی بر ارتقای سلامت انسان و پیشگیری از بیماری‌ها دارند. میوه توت‌فرنگی میوه‌ای نافرزاگرا است و برای به‌دست آوردن حداکثر کیفیت بازاریابی باید در مرحله بلوغ کامل برداشت شود. این میوه همچنین به‌دلیل سرعت تنفس بالا، مقاومت مکانیکی کم و حساسیت بالا به حمله پاتوژن‌ها بسیار مستعد فاسدشدن است (Hashmi et al., 2013; Neri et al., 2014). با این حال، ویژگی‌های فیزیولوژیکی میوه‌های

توت‌فرنگی (*Fragaria × ananassa* Duch.) یک محصول مهم اقتصادی در سراسر جهان است (Ahn et al., 2021; Ilari et al., 2021). ارزش غذایی زیادی دارد زیرا حاوی مواد معدنی، ویتامین‌ها، فلاونوئیدها و ترکیبات فنلی با خواص بیولوژیکی مفید است، به‌عنوان مثال فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی، ضدسرطانی و ضدالتهابی دارد

۱، ۲ و ۴- به‌ترتیب کارشناسی ارشد و دانشیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران  
(\*- نویسنده مسئول: Email: Ehteshamnia.ab@lu.ac.ir)

۳- استادیار گروه بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

۵- دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

نشان می‌دهد. این فعالیت‌ها شامل خواص آنتی‌اکسیدانی آن در غذا و در داخل بدن و مهار باکتری‌های بیماری‌زا، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌های بیماری‌زا و حشرات در محیط آزمایشگاهی و در غذای انسانی حساس به آنتی‌بیوتیک و مقاوم به آنتی‌بیوتیک انسانی و مواد غذایی است (Friedman, 2014). به‌طور کلی کارواکرول به‌عنوان ایمن (GRAS)<sup>۱</sup> برای مصرف توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده شناخته می‌شود و در حال حاضر در صنایع غذایی به‌عنوان یک عامل طعم‌دهنده و در بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود (Kachur et al., 2019). هی و همکاران (He et al., 2018) در پژوهشی به ارزیابی تیمار قبل از برداشت لیگوساکاریدهای کیتوسان بر کیفیت میوه توت‌فرنگی پرداختند. نتایج نشان داد که سفتی میوه، ویسکوزیته، لیگنین، مواد جامد محلول، پروتئین، مواد جامد محلول کل در میوه‌های تیمار شده با لیگوساکارید کیتوسان نسبت به شاهد افزایش یافت. علاوه بر این، تیمار لیگوساکارید کیتوسان قبل از برداشت تأثیر مثبتی بر فعالیت مهارکننده آنتوسیانین، فنل کل، فلاونوئید، محتوای ویتامین ث و میزان آنتی‌اکسیدان توت‌فرنگی داشت (He et al., 2018). پرتو و همکاران (Peretto et al., 2014)، در پژوهشی به ارزیابی افزایش ماندگاری توت‌فرنگی با بخارهای ضد میکروبی کارواکرول و متیل سینامات منتشر شده از پوشش‌های خوراکی توت‌فرنگی پرداختند. نتایج نشان دادند که تأخیر و کاهش قابل توجهی در شدت پوسیدگی در میوه‌های تیمار شده مشاهده شد (Peretto et al., 2014). باتوجه به اینکه پژوهشی راجع به بررسی اسانس کارواکرول حاصل از مرزه خوزستانی در ترکیب با پلیمر زیستی کیتوزان انجام نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر تیمارهای قبل از برداشت کیتوزان ترکیب شده با اسانس کارواکرول در غلظت‌های مختلف بر حفظ و بهبود خصوصیات کمی و کیفی میوه توت‌فرنگی رقم 'پاروس' در طی دوره پس از برداشت انجام شد.

### مواد و روش‌ها

این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار و هر تکرار پنج گلدان، جمعاً بیست گلدان برای هر تیمار بر روی گیاه توت‌فرنگی رقم 'پاروس' انجام شد. نشاهای توت‌فرنگی از نهالستان مورد تایید جهاد کشاورزی استان کردستان تهیه و در گلدان‌های پلاستیکی با قطر دهانه ۱۵ سانتی‌متر و ارتفاع ۱۷ سانتی‌متر در بستر کاشت با نسبت وزنی ۱:۱:۲ شامل خاک (لومی رسی)، کود دامی پوسیده، ماسه کشت شد. اولین آبیاری بلافاصله بعد از کاشت و آبیاری

توت‌فرنگی به راحتی از بین می‌رود، زیرا نرم شدن آن‌ها باعث کاهش ماندگاری پس از برداشت آن‌ها در انبار سرد می‌شود (Eum et al., 2021; Chiabrando et al., 2019). توت‌فرنگی یکی از میوه‌های پرطرفدار و با طعمی لذیذ است که در مناطق معتدل کشت می‌شود. به‌دلیل خواص دارویی و غذایی، کشت توت‌فرنگی رو به افزایش است (Nezmer et al., 2018). تلفات پس از برداشت محصول یک مبارزه دائمی برای کشاورزی مدرن است که توسعه جایگزین‌های جدید برای کاهش ضایعات را ضروری می‌کند (De Corato, 2020; Ziv & Fallik, 2021). برای افزایش عمر نگهداری میوه‌ها و سبزیجات تازه و با حداقل فرآوری شده، چندین جایگزین و درمان فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پیشنهاد شده است (Agriopoulou et al., 2020). اخیراً روش‌های ازن، بسته‌بندی جوی کنترل‌شده، ترکیبات طبیعی، پوشش‌های خوراکی ضدقارچ و عوامل کنترل زیستی به‌عنوان جایگزین‌های ایمن و روش‌های نگهداری کارآمد در صنعت محصولات تازه ظاهر شده‌اند (Romanazzi et al., 2018; Tzortzakos & Xylia, 2019; Abd-Elkader et al., 2021). پوشش‌های خوراکی از پلیمرهای طبیعی مانند کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، موم‌ها و کامپوزیت‌های آن‌ها تشکیل شده‌اند که میوه‌ها را از محیط اطراف جدا می‌کند (Farina et al., 2020; Ghoora & Srividya 2020). پوشش‌های حاوی فیلم‌های خوراکی و اسانس‌ها (EOs) همچنین می‌توانند با کاهش تعرق و تنفس به حفظ کیفیت میوه‌ها پس از برداشت کمک کنند (Hosseini et al., 2019; Yuan et al., 2016). آنها همچنین با کاهش رشد میکروبی و افزایش کیفیت بافت میوه‌ها و سبزیجات در برابر فساد محافظت می‌کنند (Khodaei et al., 2021; Kahramano, 2016; Nair et al., 2020). استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل پاتوژن‌های گیاهی باعث کاهش استفاده از قارچ کش‌ها می‌گردد. کیتوزان با قابلیت دوگانه کنترل میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و فعال‌سازی پاسخ‌های دفاعی القایی، به‌عنوان ماده غیرسمی قابل اطمینان در برخورد با پاتوژن‌ها شناخته شده است (Shirzad, 2013). همچنین به‌دلیل حلالیت بالا، غیر سمی بودن و زیست سازگاری، به‌عنوان یک ماده تنظیم‌کننده گیاهی سازگار با محیط زیست در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، مطالعه اثر کیتوزان بر کیفیت میوه توت‌فرنگی مورد توجه است (Nia et al., 2023). گیاهان معطر ترکیبات آلی تولید می‌کنند که ممکن است در دفاع از گیاهان در برابر حشرات گیاهی، باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها نقش داشته باشد. یکی از این ترکیبات به نام کارواکرول (۵-ایزوپروپیل-۲-متیل فنل) که در غلظت‌های بالایی در اسانس‌هایی مانند مرزه خوزستانی یافت می‌شود، گزارش شده است که فعالیت‌های زیستی متعددی در سلول‌ها و حیوانات

1- generally recognized as safe

M1=وزن نمونه در روز اول و M2=وزن نمونه در روز پایانی

### اندازه گیری مواد جامد محلول

مواد جامد محلول توت فرنگی‌ها در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد تعیین شد. ابتدا براساس پالمو و گروسو (Tanada-Palmu & Grosso, 2005)، با همزن مکانیکی به‌طور کامل و یکدست مخلوط شدند تا پوره همگن میوه بدست آید. با استفاده از رفاکتومتر ATAGO (مدل ان یک، ژاپن) مقدار مواد جامد محلول نمونه‌ها قرائت شد، پیش از شروع به کار، رفاکتومتر با آب مقطر کالیبره گردید. پس از هر بار قرائت به‌دقت رفاکتومتر تمیز شد تا از خطا جلوگیری گردد.

### اسیدیته قابل تیتراسیون

اسیدیته براساس درصد اسیدسیتریک موجود در میوه با استفاده از روش پتانسیومتری توصیف شده توسط (Tanada-Palmu & Grosso, 2005) اندازه‌گیری شد. برای این منظور ۵ گرم از مخلوط پوره میوه در بشر کوچکی ریخته شد و با اضافه کردن آب مقطر به حجم ۵۰ رسانده شد. از هیدروکسیدسدیم ۰/۱ نرمال تا رسیدن pH به ۸/۱ استفاده گردید. اسیدیته قابل تیتر به‌صورت درصد اسیدسیتریک بیان شد. برای این منظور، مقدار هیدروکسیدسدیم مصرفی با استفاده از رابطه ۳ تبدیل به درصد اسیدسیتریک شد.

$$\text{اسیدیته قابل تیتراسیون} = V \times 0.064 \quad (2)$$

### شاخص رسیدگی (شاخص طعم)

نسبت TSS به TA با تقسیم TSS به درصد TA، پس از قرائت درصد مواد جامد محلول (TSS) با دستگاه رفاکتومتر و محاسبه اسیدیته قابل تیتراسیون با روش تیتراسیون (TA) محاسبه شد (Saki, 2019).  
(*et al.*)

### سفتی بافت

سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه سفتی‌سنج (Lutron FG5020, Taiwan) و با یکبار نفوذ میله نفوذکننده با قطر ۳ میلی‌متر در نیمه استوایی هر میوه انجام شد. سفتی بافت میوه براساس بیشینه نیروی لازم برای نفوذ میله در گوشت میوه و برحسب کیلوگرم نیرو (Kgf) بیان گردید.

### اندازه‌گیری pH میوه

میزان پی‌اچ آب میوه با استفاده از دستگاه پی‌اچ‌سنج (مدل، ۳۲۲۰، جنوبی) اندازه‌گیری شد. در هر نوبت اندازه‌گیری ابتدا دستگاه با بافرهای

های بعدی تا زمان استقرار کامل گیاه هر دو روز یکبار به‌صورت دستی صورت انجام شد. تیمارها شامل شاهد (صفر)، کارواکرول ۰/۳ درصد، کارواکرول ۰/۶ درصد، ترکیب کیتوزان ۱/۵ درصد با کارواکرول ۰/۳ درصد و ترکیب کیتوزان ۱/۵ درصد با کارواکرول ۰/۶ درصد بودند و بوته‌های توت‌فرنگی در سه مرحله شامل گلدهی، تشکیل میوه و تغییر رنگ میوه محلول‌پاشی شدند. به‌منظور ارزیابی عمر پس از برداشت میوه توت‌فرنگی با استفاده از تیمارهای ذکر شده، میوه‌ها در زمان رسیدن کامل برداشت شدند. میوه‌ها به انبار با دمای چهار درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی  $90 \pm 5$  درصد انتقال یافتند. سپس به فاصله هر ۱۰ روز یک بار در طول ۳۰ روز انبارمانی، ۴ میوه از هر تکرار به‌طور تصادفی انتخاب و خصوصیات بیوشیمیایی میوه‌ها نظیر کل مواد جامد محلول، آنتی‌اکسیدان و اسیدهای آلی، مورد ارزیابی قرار گرفت.

### آماده‌سازی میکس کیتوزان با اسانس (کارواکرول)

برای تهیه ترکیب کیتوزان با جرم مولکولی متوسط با کارواکرول ابتدا ۱/۵ درصد کیتوزان (وزنی/وزنی) استفاده شده یعنی ۱/۵ گرم کیتوزان در ۱۰۰ سی‌سی آب مقطر استفاده گردید، و برای حل شدن بهتر ۵۰۰ میکرولیتر استیک‌اسید یک درصد (حجمی/حجمی) به آن اضافه شد. به‌منظور افزایش کارایی و انعطاف‌پذیری پوشش‌ها از نرم کننده گلیسرول ۲۰ درصد (وزنی/وزنی) استفاده شد. همچنین این ماده به‌عنوان نرم‌کننده، به افزایش تحرک مولکول‌های پلیمر کیتوزان کمک می‌کند. پس از تنظیم پی‌اچ ۵/۵، ۲۰ درصد (وزنی/وزنی) به وزن کل محلول از ترکیب کارواکرول به‌عنوان، ترکیب طبیعی داخل محلول گنجانده شد. سپس امولسیون تولید شده، در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد تحت فراصوت قرار گرفت. سپس محلول تولید شده، داخل پتريديش، ریخته در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷۲ ساعت توسط آون خشک و به‌ترتیب ۰/۳ و ۰/۶ درصد (۰/۳ و ۰/۶ در ۱۰۰ سی‌سی آب مقطر به‌همراه مقدار کمی DMSO) با پایه ۱/۵ درصدی کیتوزان استفاده گردید (Fernández-Pan et al., 2015).

### کاهش وزن

نمونه‌هایی که برای این آزمون انتخاب شدند به‌طور جداگانه و ثابت در یک ظرف برچسب‌گذاری شده نگهداری شدند. از هر تیمار ۴ میوه انتخاب گردید. در روز اول پس از اعمال تیمارها وزن اولیه نمونه‌ها با دقت اندازه‌گیری شد. در روزهای دیگر نیز وزن نمونه‌ها اندازه‌گیری شد و اختلاف میان وزن نمونه‌ها در روزهای مختلف با روز اول بیانگر میزان کاهش وزن می‌باشد، که به‌صورت درصد افت وزن بیان شد (Tanada-Palmu & Grosso, 2005).

$$\text{درصد کاهش وزن} = (M1 - M2) / M2 \times 100 \quad (1)$$

۴ و ۷ کالیبره شد. سپس الکتروود دستگاه داخل آب میوه قرار داده شد و پس از ثابت شدن عدد نمایش داده شده، میزان پی‌اچ ثبت شد.

### ویتامین ث

محتوای ویتامین ث مطابق با روش تیتراسیون ۶،۲-دی کلروفنول ایندوفنل برآورد شد. به‌طور خلاصه، ۵ گرم توت‌فرنگی در ۵۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۰۲ گرم در میلی‌لیتر اسیدگزالیک همگن شد و سپس در ۱۵۰۰ دور به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ شد. مایع‌رویی (۱۰ میلی‌لیتر) با ۰/۱ درصد ۶،۲-دی‌کلرو فنول ایندوفنول به رنگ صورتی دائمی تیترا شد. غلظت ویتامین ث با توجه به حجم تیتراسیون ۶،۲ دی‌کلروفنول ایندوفنول با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد و به‌صورت میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم وزن میوه (FW) بیان شد (Nia et al., 2023).

$$\text{NaOH normality (0.1N)} \times \text{Citric acid (\%)} = \text{Titre (mL)} \\ \times \text{ citric acid eq. weight (64gm)} \times \text{vol. made up (50mL)} \times \\ \text{wt. of sample} \times \text{Vol. of sample for titrate (5mL)} / 100 \\ 1000 \times \text{taken (10 g)}$$

### تهیه عصاره توت‌فرنگی

۲/۵ گرم میوه توت‌فرنگی با نیتروژن مایع به‌طور کامل پودر شدند. سپس ۳۷/۵ میلی‌لیتر متانول حاوی ۰/۲ درصد استیک اسید به پودر توت‌فرنگی اضافه شد و به مدت ۲ ساعت در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد بن‌ماری شد. پس از عبور از صافی، به مدت ۱۵ دقیقه در ۱۰۰۰۰ دور سانتریفیوژ شدند و مایع‌رویی شفاف برای تجزیه و تحلیل صفات مورد بررسی در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد (He et al., 2018).

### محتوای فنل کل

محتوای فنل کل با استفاده از روش فولین سیکالتیو (Slinkard et al., 1977; Singleton et al., 1999) مورد بررسی قرار گرفت. به‌طور خلاصه، برای هر لوله آزمایش، ۲۰۰ میکرولیتر عصاره، ۲ میلی‌لیتر از معرف فولین سیکالتیو ۱۰ درصد و ۴ میلی‌لیتر سدیم کربنات یک مولار اضافه شد. لوله آزمایش به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق در تاریکی قرار گرفت. سپس نمونه‌ها در طول موج ۷۶۵ نانومتر اندازه‌گیری شد. اسیدگالیک در غلظت‌های مختلف (صفر، ۳۱/۲۵، ۶۲/۵، ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰) به‌عنوان استاندارد استفاده شد و نتایج به‌صورت میلی‌گرم اکسی‌والانت اسیدگالیک در گرم وزن میوه بیان شد (Nia et al., 2023).

### ارزیابی محتوای فلاونوئید کل

محتوای فلاونوئیدها با استفاده از روش رنگ‌سنجی اندازه‌گیری شد. ۱۰۰۰ میکرولیتر عصاره توت‌فرنگی و ۵۰۰ میکرولیتر نیتريت سدیم ۵ درصد در یک فالکون ۱۰ میلی‌لیتری اضافه شد. پس از ۶ دقیقه، ۵۰۰ میکرولیتر نیتريت آلومینوم ۱۰ درصد اضافه شد و اجازه داده شد به مدت ۶ دقیقه بماند. سپس ۴ میلی‌لیتر از هیدروکسید سدیم ۴ درصد و الکل اتیلیک ۷۰ درصد به فالکون‌ها اضافه و به مدت ۱۲ دقیقه اجازه داده شد تا بماند. در نهایت جذب در طول موج ۵۰۲ نانومتر اندازه‌گیری شد. از ماده روتین در غلظت‌های مختلف (صفر، ۳۱/۲۵، ۶۲/۵، ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰) برای رسم منحنی استاندارد استفاده شد و نتایج به‌صورت میلی‌گرم در گرم وزن میوه گزارش شد (He et al., 2018).

### ماندگاری میوه (تعداد روز)

مدت زمان نگهداری، از زمان نگهداری تا تاریخ انقضا در نظر گرفته شد. زمان ماندگاری میوه‌ها با ثبت تعداد روزهایی که در انبار با حفظ ویژگی‌های کیفی و بدون هیچ‌گونه فساد میکروبی تعیین شد. زمانی که میوه‌ها بیش از ۵۰ درصد از بین رفتند، به‌عنوان پایان ماندگاری گزارش گردید (Nia et al., 2021).

### تجزیه آماری داده‌ها

آزمایش به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و هر تکرار پنج گلدان انجام شد. فاکتور اول، نوع مواد در پنج سطح صفر (شاهد)، کارواکرول ۰/۳ درصد، کارواکرول ۰/۶ درصد، ترکیب کیتوزان ۱/۵ درصد با کارواکرول ۰/۳ درصد و کیتوزان ۱/۵ درصد با کارواکرول ۰/۶ درصد می‌باشد و فاکتور دوم زمان انبارداری در چهار سطح شامل صفر، ۱۰، ۲۰، ۳۰ روز پس از انبارمانی بود. تجزیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS انجام شد. برای رسم نمودار از نرم افزار اکسل استفاده شد. داده‌ها به‌صورت میانگین خط‌های استاندارد ارائه شده و اختلاف معنی‌داری بین تیمارها برای هر صفت با حداقل اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد مشخص شد.

### نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تاثیر نوع تیمار و زمان انبارمانی در تمامی صفات (سطح احتمال یک درصد) معنی‌دار بوده است اما اثر متقابل در صفت سفتی معنی‌دار نشد (جدول ۱).

جدول ۱- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر خصوصیات بیوشیمیایی، کیفی و ماندگاری توت فرنگی (*Fragaria × ananassa* Duch)  
 Table 1- Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on biochemical, qualitative and shelf life characteristics of strawberry (*Fragaria × ananassa* Duch)

منابع تغییرات S.O.V	درجه ازادی df	فلاونوئید Flavonoid	فنول کل Total phenolic	ویتامین C Vitamin C	شاخص طعم TSS/TA <sup>r</sup>	مواد جامد محتول TSS	اسیدیته TA	سفتی Firmness	پایه pH	کاهش وزن Weight Loss
نوع محلول پوشش دهی Type of coating solution	4	0.096**	0.897**	493.37**	105.32**	7.025**	0.0022**	2.015**	1.167**	288.364**
زمان انبارش Storage	3	0.039**	0.697**	2335.44**	107.12**	4.770**	0.0022**	2.237**	0.274**	551.861**
نوع محلول پوشش دهی زمان انبارش Type of coating solution*Storage	12	0.0014*	0.129**	16.04**	10.127**	1.747*	0.0018**	0.166 <sup>ns</sup>	0.0698*	55.896**
خطا Error	40	0.057	0.011	5.24	1.002**	0.823	0.0001	0.1291	0.029	1.978
ضریب تغییرات CV	.	25.006	7.678	7.229	4.184	8.906	2.538	14.461	5.821	17.499

\*، \*\*، \*\*\* و ns وجود اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 و 1 درصد و عدم اختلاف معنی دار.  
 \*, \*\*, \*\*\* and ns: Significant at 5% and 1% levels of probability and non-significant, respectively.



## کاهش وزن (WL)


کنترل کاهش وزن میوه‌ها و سبزی‌های تازه یکی از مهم‌ترین اهداف پوشش‌دهی است. در دوره پس از برداشت دو عامل مهم باعث از دست دادن آب و کاهش وزن محصول می‌شود. یکی قطع شدن رابطه آب میوه با گیاه مادری و دومی افزایش تعرق در سطح میوه که یک فرآیند فیزیکی است و منجر به از دست دادن رطوبت محصول می‌شود. تغییرات کاهش وزن میوه در شرایط پس از برداشت بسته به نوع محصول، رقم و خصوصیات بافت آن می‌تواند متفاوت باشد، که این موضوع با دما و رطوبت انبار نیز در نتیجه میوه‌های پوشش داده شده با کیتوزان تغییرات کاهش وزن کم‌تری نسبت به میوه‌های شاهد دارد (Ergun & Satici, 2012). نتایج مقایسات میانگین مربوط به میزان کاهش وزن نمونه‌های تیمار شده با کیتوزان و کارواکرول در شکل ۱ نشان داده شده است. براساس این نتایج، با افزایش زمان نگهداری، تمامی نمونه‌ها به‌طور پیوسته کاهش وزن ناشی از تبخیر رطوبت را داشتند. به‌طوری که در روز آخر آزمایش، بیش‌ترین میزان کاهش وزن مربوط به نمونه شاهد (۳۰/۶۶ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به تیمار ترکیبی کیتوزان و کارواکرول (۵/۵۷ درصد) بوده و همچنین کاربرد تیمارهای ترکیبی کیتوزان با کارواکرول (۰/۳ و ۰/۶) باعث کاهش وزن کم‌تری نسبت به سایر تیمارها داشته است. درواقع در تیمار ترکیبی کیتوزان با کارواکرول ۰/۶ کاهش وزن کم‌تری نسبت به تیمار ترکیبی کیتوزان با کارواکرول ۰/۳ هم مشاهده شد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد که ترکیب کارواکرول در پوشش خوراکی مانند کیتوزان نیز بر جلوگیری از کاهش وزن توت‌فرنگی‌ها موثر بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که به‌مانند سایر پوشش‌های خوراکی (کیتوزان)، کارواکرول نیز موجب جلوگیری از افت رطوبت و کنترل تغییرات تنفسی شد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش میزان اسانس، افت وزنی کم‌تری در نمونه‌ها اتفاق می‌افتد. تغییرات کاهش وزن میوه در روزهای آخر به‌علت افزایش فعالیت متابولیکی و همچنین رشد سریع میکروبی با تخریب بافت میوه می‌باشد. در مطالعه علی‌رضالو و همکاران (Alirezalu et al., 2018) در تمامی تیمارها با افزایش زمان نگهداری به‌علت تبخیر سطحی، میزان آب میوه‌ها کاهش و درصد کاهش وزن افزایش پیدا کرد. در این میان بیش‌ترین درصد کاهش وزن مربوط به تیمار شاهد و کم‌ترین درصد کاهش وزن مربوط به توت‌فرنگی پوشش داده شده با یک درصد کیتوزان حاوی ۱۰ درصد عصاره چای سبز بود (Alirezalu et al., 2018). در مطالعه فیض‌اللهی و همکاران (Feyzollahi et al., 2022)، به‌طوری که بیش‌ترین درصد کاهش

وزن مربوط به تیمار شاهد در روز ۱۵ نگهداری (۴۸/۰۸ درصد) و کم‌ترین میزان کاهش وزن (۶/۵۶ درصد) مربوط به نمونه‌های بسته‌بندی شده با فیلم حاوی ۲۰٪ اسانس بود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از کیتوزان و اسانس باعث کاهش درصد کاهش وزن میوه‌ها شد که با نتایج این پژوهش‌ها مطابقت دارد.


## مواد جامد محلول کل (TSS)

نتایج مقایسه میانگین مربوط به مواد جامد محلول طی دوره انبارداری در دمای سرد نشان داد با افزایش زمان نگهداری توت‌فرنگی‌ها، مواد جامد محلول میوه به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (شکل ۲). به‌طوری که کم‌ترین مقدار در روز آخر مربوط به تیمار شاهد (۷/۱۷ درصد) و در روز آخر بیش‌ترین میزان مواد جامد محلول مربوط به تیمار کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ درصد (۱۱/۷۳ درصد) مشاهده شد. کاربرد تیمار ترکیبی کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ نسبت به تیمار ترکیبی کیتوزان و کارواکرول ۰/۳ باعث افزایش بیش‌تر در مواد جامد محلول گردید. همچنین کاربرد تیمارهای ترکیبی کیتوزان و کارواکرول (۰/۳ و ۰/۶)، باعث مواد جامد محلول بیش‌تری نسبت به سایر تیمارها گردید. به‌نظر می‌رسد کاهش مواد جامد محلول میوه در تیمار شاهد در روزهای آخر به‌علت افزایش فعالیت متابولیکی، رشد سریع میکروبی با تخریب بافت میوه و همچنین طعم نامطلوب میوه با توجه به تست پانل (ترشیدگی) می‌باشد. در مطالعه رستم‌زاده و همکاران (Rostamzadeh et al., 2015) نشان داد که افزایش مواد جامد محلول در همه تیمارها نسبت به شاهد معنی‌دار بوده است. تفاوت معنی‌داری بین تیمار یک و دو درصد وجود نداشت. در این بین بیش‌ترین مقدار مواد جامد محلول مربوط به تیمار دو درصد کیتوزان و کم‌ترین متعلق به شاهد بود. از آنجایی که اسیدآلی و نشاسته در طی فرایند تنفس مصرف شده و منبع تأمین مواد جامد محلول می‌باشند، می‌توان بالا بودن مواد جامد محلول در تیمار کیتوزان دو درصد و یک درصد را با مصرف شدن این دو ترکیب در آنها مرتبط دانست. تأثیر کیتوزان بر میزان مواد جامد محلول در میوه‌های مختلف متفاوت است مثلاً در پاپایا تأثیر معنی‌داری نداشت و در انبه باعث افزایش آن گردید (Bautista-Banos et al., 2003; Srinivasa et al., 2002).





شکل ۱- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر کاهش وزن میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی  
 Fig. 1. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on weight loss of Paros strawberry fruit during storage




شکل ۲- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر مواد جامد محلول کل بافت میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی  
 Fig. 2. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on total soluble solids of Paros strawberry fruit tissue during storage

نیرو) در روز ۱۰ و کمترین میزان سفتی مربوط به تیمار شاهد (۱/۲۷ کیلوگرم نیرو) در روز آخر بوده است. به طوری که در توت فرنگی های پوشش داده شده با کیتوزان و کارواکرول (۰/۳ و ۰/۶) از سفتی بیش تری نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد (شکل ۳). در مطالعه ای انگورهای پوشش داده شده با کیتوزان و آلونئورا به طور قابل توجهی سفت تر از میوه های تیمار شده با کیتوزان بودند. ( $P < 0.05$ )

#### سفتی بافت<sup>۱</sup> (FR)

سفتی، یک ویژگی مهم حسی، شاخصی از ماندگاری و کیفیت میوه است. نتایج نشان داد طی ۳۰ روز نگهداری توت فرنگی ها در یخچال، سفتی بافت نمونه شاهد کاهش یافت. به طوری که با افزایش زمان میزان سفتی بافت میوه در تمامی تیمارها تا روز ۱۰ افزایش پیدا کرد و بعد از آن روند کاهشی در روز آخر مشاهده شد. در واقع بیشترین میزان سفتی مربوط به تیمار کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ درصد (۳/۸ کیلوگرم



شکل ۳- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر سفتی بافت میوه توت‌فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی  
 Fig. 3. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on firmness of Paros strawberry fruit tissue during storage

به‌نظر می‌رسد افزایش اسیدپتیه میوه در تیمار شاهد در روزهای آخر به‌علت افزایش فعالیت متابولیسی میوه، رشد سریع میکروبی با تخریب بافت میوه و همچنین طعم نامطلوب میوه با توجه به تست پانل می‌باشد. با طولانی شدن زمان انبارمانی میزان اسید قابل تیتراسیون در میوه‌های پوشش داده‌شده کاهش یافت؛ اما شدت کاهش در نمونه‌های شاهد کندتر بود (Ali et al., 2011).


#### شاخص طعم (TSS/TA)

نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که نسبت TSS/TA در تمامی تیمارها (شاهد تا روز ۱۰) تا روز ۲۰ افزایش یافته است اما در روز آخر در تمامی تیمارها میزان شاخص طعم کاهش پیدا کرده است. در واقع میزان افزایش شاخص طعم در میوه‌های گروه شاهد کندتر از میوه‌های پوشش داده شده با کیتوزان بود. به‌طوری‌که بیش‌ترین میزان نسبت TSS/TA مربوط به تیمار کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ (۳۰/۴۴) در روز ۲۰ و کم‌ترین این نسبت مربوط به تیمار شاهد (۱۶/۵۶) در روز آخر مشاهده شد در واقع توت‌فرنگی پوشش داده شده با کیتوزان و کارواکرول (۰/۳ و ۰/۶) از شاخص طعم بهتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار شدند (شکل ۵). نتایج این شاخص با پژوهش‌های سایر محققین، در میوه انگور با کاربرد پوشش کیتوزان مطابقت داشت (Nia et al., 2021).


میزان نرم شدن میوه به‌طور مستقیم با سرعت پوسیدگی ترکیبات پکتین از طریق فعالیت آنزیمی آنزیم‌های پکتین‌متیل‌استراز (PME) و پلی‌گالاکتورناز (PG) در طول رسیدن مرتبط است. کیتوزان فعالیت آنزیم‌های تخریب‌کننده دیواره سلولی را کاهش می‌دهد و پوسیدگی قارچی را کاهش می‌دهد که در نتیجه می‌تواند سفتی بافت را در مقایسه با شاهد حفظ کند (Mostofi et al., 2010). نتایج این آزمایش با دیگر پژوهش‌های انجام‌شده روی انبه، گوجه و ذغال‌اخته مطابقت دارد به طوری‌که تیمار کیتوزان توانسته از کاهش سفتی بافت میوه طی مدت انبارمانی جلوگیری کند (Chien et al., 2007; Duan et al., 2001; Liu et al., 2007).

#### اسیدپتیه قابل تیتر (TA)

مقدار اسیدهای قابل تیتراسیون با رسیدگی محصول در ارتباط است و موجب طعم ترش در میوه‌ها و سبزی‌ها می‌گردند. با رسیدن در اکثر میوه‌ها میزان اسیدهای آلی کاهش می‌یابد (Jalili Marandi, 2013). نتایج مقایسه میانگین مربوط به اسیدپتیه طی دوره انبارمانی در دمای سرد نشان داد که با افزایش زمان نگهداری توت‌فرنگی‌ها، همه‌ی تیمارها به‌جز شاهد (تا روز ۱۰) اسیدپتیه آن‌ها به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (شکل ۴). به‌طوری‌که بیش‌ترین میزان اسیدپتیه در روز ۳۰ مربوط به شاهد (۰/۴۳) درصد اسیدسیتریک بوده است. در واقع در طی آزمایش در روزهای آخر، تیمارهای ترکیبی کیتوزان با کارواکرول (۰/۳ و ۰/۶) از اسیدپتیه بیش‌تری نسبت به سایر تیمارها به‌جز شاهد مشاهده شد.



شکل ۴- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر اسیدیته قابل تیتر بافت میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی  
 Fig. 4. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on titratable acidity of Paros strawberry fruit tissue during storage




شکل ۵- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر شاخص طعم بافت میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی  
 Fig. 5. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on the taste index of Paros strawberry fruit texture during storage

که باعث کاهش میزان تنفس و رشد میکروبها می شود. علت افزایش میزان pH در تیمار شاهد می تواند به دلیل عدم وجود پوشش مناسب در اطراف آن باشد که باعث افزایش میزان تنفس میوه و مصرف اسیدهای آلی و همچنین مربوط به رشد نسبی کپکها و مخمرها و مصرف اسیدهای آلی توسط آنها باشد (Zivanovic et al., 2007). نتایج مشابه در رابطه با پوشش گوآوا با فیلم بر پایه صمغ عربی حاوی اسانس دارچین (Etmedipoor et al., 2019) و فیلم زیست تخریب پذیر پلی وینیل الکل و کیتوزان برای بسته بندی توت فرنگی (Ding et al., 2019) گزارش شده است.

#### pH

نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان داد که در طول مدت زمان نگهداری میزان pH توت فرنگی های پوشش داده شده و شاهد افزایش پیدا کرد. pH توت فرنگی های پوشش داده شده به صورت معنی داری ( $P < 0/01$ ) کم تر از نمونه شاهد بود (جدول ۱). به طوری که کم ترین pH مربوط به تیمار کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ در ۱۰ روز بعد از انبارمانی (۲/۱۹) و بیش ترین میزان pH در روز آخر مربوط شاهد (۳/۳۵) بوده است (شکل ۶). علت این تغییر احتمالا می تواند مربوط به ممانعت کنندگی پوشش کیتوزان و اثرات ضد میکروبی کارواکرول باشد




شکل ۶- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر پی اچ بافت میوه توت‌فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی  
 Fig. 6. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on pH of Paros strawberry fruit tissue during storage

## ویتامین‌ت

### میزان فنل کل

مقایسه میانگین‌های داده‌ها، نشان داد که روند تغییر فنل کل طی دوره نگهداری میوه در همه تیمارها به‌جز شاهد تا ۱۰ روز بعد از انبارمانی افزایشی، اما پس از آن میزان فنل کل کاهش‌ی بود. به‌طوری‌که بیش‌ترین میزان فنل مربوط به تیمار کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ درصد (۲۰/۴۹ میلی‌گرم اسیدگالیک در ۱۰۰ گرم وزن تر) در روز ۱۰ و کم‌ترین آن مربوط به تیمار شاهد (۰/۷۴ میلی‌گرم اسیدگالیک در ۱۰۰ گرم وزن تر) در روز آخر مشاهده شد، همچنین تیمارهای ترکیبی کیتوزان با کارواکرول (۰/۳ و ۰/۶ درصد) میزان فنل بیش‌تری نسبت به سایر تیمارها داشتند (شکل ۸). میزان فنل میوه‌ها و سبزی‌ها پس از برداشت می‌تواند کاهش یا افزایش یابد که این امر بستگی زیادی به شرایط انبارمانی دارد. نگهداری میوه‌های بالغ در سردخانه به‌طور معنی‌داری باعث افزایش فنل‌ها می‌گردد و این مسئله می‌تواند به‌واسطه تغییرات در متابولیسم فنلی در طی انبارمانی و همچنین افزایش فعالیت فنیل آلانین آمونیلایز باشد. آزمایشی که روی سیب انجام گرفت، نشان داد که میزان فنل کل پس از پایان دوره نگهداری طولانی در انبار افزایش یافته است (Leja *et al.*, 2008). قاسم‌نژاد و همکاران (Ghasemnezhad *et al.*, 2010) گزارش کردند که زردآلوهای تیمار شده با کیتوزان در مقایسه با شاهد از ترکیبات فنلی بیش‌تری برخوردار بودند.


براساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها اثرات متقابل تیمارهای ترکیبی کیتوزان با کارواکرول تاثیر مثبتی بر میزان ویتامین‌ت توت‌فرنگی در چهار زمان اندازه‌گیری داشتند. بطوری‌که در روز آخر بیش‌ترین مقدار ویتامین‌ت مربوط به تیمار کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ درصد (۲۴/۶۱ میلی‌گرم در گرم وزن تر) و کم‌ترین میزان ویتامین‌ت مربوط به تیمار شاهد (۱۰/۷۱ درصد میلی‌گرم در گرم وزن تر) مشاهده شد و همچنین تیمارهای ترکیبی کیتوزان با کارواکرول (۰/۳ و ۰/۶) نسبت به سایر تیمارها ویتامین‌ت بیش‌تری مشاهده شد (شکل ۷). در مطالعه رستم‌زاده و همکاران (Rostamzadeh *et al.*, 2015)، کم‌ترین ویتامین‌ت در شاهد و بیش‌ترین در غلظت یک درصد کیتوزان وجود داشت. کاهش میزان ویتامین‌ت طی مدت انبارمانی ممکن است ناشی از افزایش اکسیداسیون حاصل از کاهش آب باشد (Shin *et al.*, 2007). با توجه به اینکه کاهش ویتامین‌ت از نظر ارزش غذایی نامطلوب است، بنابراین جلوگیری از کاهش آن که احتمالاً با جلوگیری از فعالیت آنزیم‌های مرتبط با اکسیداسیون آن صورت می‌گیرد، در ماندگاری ارزش تغذیه‌ای میوه سیب بسیار مفید است (Mac Lean *et al.*, 2000). نتایج این پژوهش با نتایج روی میوه‌های انبه و لیچی مطابقت دارد و بیانگر این است که پوشش کیتوزان توانسته است در طول مدت انبارمانی، از دست رفتن ویتامین‌ت را کم کرده و اکسیداسیون آن را کاهش دهد (Chien *et al.*, 2007; Dong *et al.*, 2004).



Control Carvacrol 0.3 Carvacrol 0.6 CTS-Carcacrol 0.3 CTS-Carcacrol 0.6

شکل ۷- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر میزان ویتامین ث میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی

Fig. 7. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on vitamin C content of Paros strawberry fruits during storage



Control Carvacrol 0.3 Carvacrol 0.6 CTS-Carcacrol 0.3 CTS-Carcacrol 0.6


شکل ۸- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر محتوای فنل کل میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی

Fig. 8. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on total phenolic content of Paros strawberry fruit during storage

### فلاونوئید

بیشترین میزان فلاونوئید مربوط به تیمار ترکیبی کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ درصد (۰/۳۴ میلی گرم در گرم وزن تر) بود و همچنین در تیمارهای ترکیبی کیتوزان با کارواکرول (۰/۳ و ۰/۶ درصد) نسبت به سایر تیمارها میزان فلاونوئید بیش‌تری مشاهده شد. بنابراین میزان فلاونوئید تیمارهای کیتوزان نسبت به شاهد افزایش یافته که نشان می‌دهد کاربرد قبل از برداشت کیتوزان به‌طور قابل توجهی بر محتوای فلاونوئید تأثیر می‌گذارد (Bursac Kovacevic et al., 2015).

فلاونوئیدها گروه عمده‌ایی از خانواده ترکیبات فنلی با فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بیولوژیکی هستند که در میوه‌ها شناسایی شده‌اند (Fernández-Pan et al., 2015). همان‌طور که در شکل ۹ نشان داده شده است، روند تغییر فلاونوئید طی دوره نگهداری میوه در همه تیمارها به‌جز شاهد تا ۱۰ روز بعد از انبارمانی به‌صورت افزایشی، اما پس از آن میزان فلاونوئید کاهشی یافت. به‌طوری‌که کم‌ترین محتوای فلاونوئید مربوط به تیمار شاهد (۰/۱۲ میلی گرم در گرم وزن تر) در روز آخر و




شکل ۹- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر میزان کل فلاونوئید میوه توت‌فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی  
 Fig. 9. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on total flavonoid content of Paros strawberry fruit during Storage

کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ درصد بوده است (شکل ۱۰). در مطالعات قبلی، ماندگاری انار (Meighani *et al.*, 2015) و انجیر تیمار شده با کیتوزان (Saki *et al.*, 2019) به ترتیب ۱۲۰ روز و ۲۰ روز، به طور قابل توجهی بیش‌تر از شاهد در طول دوره نگهداری بود.

#### ماندگاری میوه (تعداد روز)

تمام تیمارهای این مطالعه بر عمر ماندگاری توت‌فرنگی تأثیرگذار بودند. براساس نتایج نشان داده شده در شکل ۱۰، کم‌ترین (۱۸ روز) و بیش‌ترین (۳۰ روز) ماندگاری میوه به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار



شکل ۱۰- کاربرد قبل از برداشت کیتوزان با کارواکرول بر ماندگاری میوه توت‌فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی  
 Fig. 10. Pre-harvest application of chitosan with carvacrol on shelf life of Paros cultivar strawberry fruit during storage

این رقم را در مقایسه با شاهد ۱۰ و ۱۲ روز بهبود بخشید. از این رو کاربرد قبل از برداشت کیتوزان و کارواکرول می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ایمن و کم‌هزینه جهت افزایش عمر پس از برداشت توت‌فرنگی رقم 'پاروس' قابل توصیه باشد.

#### نتیجه‌گیری

به‌طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تیمار ترکیبی کیتوزان و کارواکرول ۰/۶ درصد، سبب بهبود صفات سفتی بافت میوه، ویتامین‌ث، مواد جامد محلول و شاخص طعم میوه توت‌فرنگی در مقایسه با دیگر تیمارها و شاهد گردید. همچنین، استفاده از این تیمارها ترکیبی (کیتوزان با کارواکرول ۰/۳ و ۰/۶) توانست عمر پس از برداشت

## منابع

1. Abd-Elkader, D.Y., Salem, M.Z.M., Komeil, D.A., Al-Huqail, A.A., Ali, H.M., Salah, A.H., Akrami, M., & Hassan, H.S. (2021). Post-harvest enhancing and *Botrytis cinerea* control of strawberry fruits using low cost and eco-friendly natural oils. *Agronomy*, 11, 1246. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061246>
2. Agriopoulou, S., Stamatelopoulou, E., Sachadyn-Król, M., & Varzakas, T. (2020). Lactic acid bacteria as antibacterial agents to extend the shelf life of fresh and minimally processed fruits and vegetables: quality and safety aspects. *Microorganisms*, 8, 952. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8060952>
3. Ahn, M.G., Kim, D.S., Ahn, S.R., Sim, H.S., Kim, S., & Kim, S.K. (2021). Characteristics and trends of strawberry cultivars throughout the cultivation season in a Greenhouse. *Horticulturae*, 7, 30. <https://doi.org/10.3390/horticulturae7020030>
4. Ali, A., Tengku, M., Muda, M., Sijam, K., & Siddiqu, Y. (2011). Effect of chitosan coatings on the physicochemical characteristics of Eksotika II papaya (*Carica papaya* L.) fruit during cold storage. *Food Chemistry*, 124, 620-626. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.085>
5. Alirezalu, K., Tavakolian, R., & Jaffarpour, P. (2018). Effect of postharvest application of chitosan coating containing green tea extract on quality characteristics and shelf life of Selva strawberry cultivar. *Research in Pomology*, 3(1), 43-56.
6. Bautista-Banos, S., Hernandez-Lopez, M., Bosquez-Molina, E., & Wilson, C.L. (2003). Effects of chitosan and plant extractes on growth of *Colletotrichum gloeosporioides*, anthracnose levels and quality of papaya fruit. *Crop Protection*, 22, 1087-1092. [https://doi.org/10.1016/S0261-2194\(03\)00117-0](https://doi.org/10.1016/S0261-2194(03)00117-0)
7. Bursac Kovacevic, D., Putnik, P., Uzelac Verica, D., & Livaj, B. (2015). Influences of organically and conventionally grown strawberry cultivars on anthocyanins content and color in purees and low-sugar jams. *Food Chemistry*, 181, 94-100. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.02.063>
8. Chiabrand, V., Garavaglia, L., & Giacalone, G. (2019). The postharvest quality of fresh sweet cherries and strawberries with an active packaging system. *Foods*, 8, 335. <https://doi.org/10.3390/foods8080335>
9. Chien, P.J., Sheu, F., & Yang, F.H. (2007). Effect of edible chitosan coating on quality and shelf life of sliced mango fruit. *Food Engineering*, 78, 225-229. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.09.022>
10. De Corato, U. (2020). Improving the shelf-life and quality of fresh and minimally-processed fruits and vegetables for a modern food industry: A comprehensive critical review from the traditional technologies into the most promising advancements. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 60, 940-975. <https://doi.org/10.1080/10408398.2018.1553025>
11. Ding, J., Zhang, R., Ahmed, S., Liu, Y., & Qin, W. (2019). Effect of sonication duration in the performance of polyvinyl alcohol/chitosan bilayer films and their effect on strawberry preservation. *Molecules*, 24(7), 1408-1414. <https://doi.org/10.3390/molecules24071408>
12. Dong, H., Cheng, L., Tan, J., Zheng, K., & Jiang, Y. (2004). Effects of chitosan coating on quality and shelf life of peeled litchi fruit. *Food Engineering*, 64, 355-358. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2003.11.003>
13. Duan, J., Wu, R., Strik, B.C., & Zhao, Y. (2011). Effect of edible coatings on the quality of fresh blueberries (Duke and Elliott) under commercial storage conditions. *Postharvest Biology and Technology*, 59, 71-79. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2010.08.006>
14. Ergun, M., & Satıcı, F. (2012) Use of *Aloe vera* gel as biopreservative for 'Granny Smith' and 'Red Chief' apples. *Journal of Animal and Plant Sciences*, 22(2), 363.
15. Etemadipoor, R., Ramezani, A., Dastjerdi, A.M., & Shamili, M. (2019). The potential of gum arabic enriched with cinnamon essential oil for improving the qualitative characteristics and storability of guava *Psidium guajava* L. fruit. *Scientia Horticulturae*, 251, 101-107. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.03.021>
16. Eum, H.-L., Han, S.-H., & Lee, E.-J. (2021). High-CO<sub>2</sub> treatment prolongs the postharvest shelf life of strawberry fruits by reducing decay and cell wall degradation. *Foods*, 10, 1649. <https://doi.org/10.3390/foods10071649>
17. Farina, V., Passafiume, R., Tinebra, I., Palazzolo, E., & Sortino, G. (2020). Use of *Aloe vera* gel-based edible coating with natural anti-browning and anti-oxidant additives to improve post-harvest quality of fresh-cut 'Fuji' apple. *Agronomy*, 10, 515. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040515>
18. Fernández-Pan, I., Maté, J. I., Gardrat, C., & Coma, V. (2015). Effect of chitosan molecular weight on the antimicrobial activity and release rate of carvacrol-enriched films. *Food Hydrocolloids*, 51, 60-68. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.04.033>
19. Feyzollahi, Y., Golmohammadi, A., Nematollahzadeh, A., & Tahmasebi, M. (2022). Evaluation the effect of biodegradable active packaging based on Zein containing *Zataria multiflora* essential oil on postharvest shelf life of strawberry. *Innovative Food Technologies*, 9(2), 113-127. <https://doi.org/10.22104/jift.2021.5248.2071>
20. Friedman, M. (2014). Chemistry and multibeneficial bioactivities of carvacrol (4-isopropyl-2-methylphenol), a component of essential oils produced by aromatic plants and spices. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 62(31), 7652-7670. <https://doi.org/10.1021/jf5023862>



21. Ghasemnezhad, M., Shiri, M.A., & Sanavi, M. (2010). Effect of chitosan coatings on some quality indices of apricot (*Prunus armeniaca* L.) during cold storage. *Journal of Environmental Sciences*, 8, 25-33. [https://cjes.guilan.ac.ir/data/cjes/coversheet/head\\_en.jpg](https://cjes.guilan.ac.ir/data/cjes/coversheet/head_en.jpg)
22. Ghoora, M.D., & Srividya, N. (2020). Effect of packaging and coating technique on postharvest quality and shelf life of *Raphanus sativus* L. and *Hibiscus sabdariffa* L. *Microgreens Foods*, 9, 653. <https://doi.org/10.3390/foods9050653>
23. Hashmi, M.S., East, A.R., Palmer, J.S., & Heyes, J.A. (2013). Hypobaric treatment stimulates defence-related enzymes in strawberry. *Postharvest Biology Technology*, 85, 77-82. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.05.002>
24. He, Y., Bose, S.K., Wang, W., Jia, X., Lu, H., & Yin, H. (2018). Pre-harvest treatment of chitosan oligosaccharides improved strawberry fruit quality. *International Journal of Molecular Sciences*, 19(8), 2194. <https://doi.org/10.3390/ijms19082194>
25. Hosseini, S.F., Amraie, M., Salehi, M., Mohseni, M., & Aloui, H. 2019. Effect of chitosan-based coatings enriched with savory and/or tarragon essential oils on postharvest maintenance of kumquat (*Fortunella* sp.) fruit. *Food Science and Technology International*, 7, 155-162. <https://doi.org/10.1002/fsn3.835>
26. Ilari, A., Toscano, G., Boakye-Yiadom, K.A., & Duca, D. (2021); Foppa pedretti, E. life cycle assessment of protected strawberry productions in central Italy. *Sustainability*, 13, 4879. <https://doi.org/10.3390/su13094879>
27. Jalili Marandi, R. (2013). *Physiology after harvesting*. Academic Jihad Publications of Urmia University. 276 p. <https://doi.org/10.3390/su142214918>
28. Kahramanoğlu, I. (2019). Effects of lemongrass oil application and modified atmosphere packaging on the postharvest life and quality of strawberry fruits. *Science Horticulture*, 256, 108527. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.05.054>
29. Khodaei, D., Hamidi-Esfahani, Z., & Rahmati, E. (2021). Effect of edible coatings on the shelf-life of fresh strawberries: A comparative study using TOPSIS-Shannon entropy method. *NFS Journal*, 23, 17-23. <https://doi.org/10.1016/j.nfs.2021.02.003>
30. Leja, M., Mareczek, A., & Ben, J. (2008). Antioxidant properties of two apple cultivars during long-term storage. *The Journal of Food Composition and Analysis*, 21, 396-401. [https://doi.org/10.1016/S0308-8146\(02\)00263-7](https://doi.org/10.1016/S0308-8146(02)00263-7)
31. Liu, J., Tian, S., Menga, X., & Xua, Y. (2007). Effects of chitosan on control of postharvest diseases and physiological responses of tomato fruit. *Postharvest Biology and Technology*, 44, 300-306. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2006.12.019>
32. Mac Lean, D.D., Murr, D.P., & DeELL, J.R.A. (2000). Modified total oxyradical scavenging capacity assay for antioxidants in plant tissues. *Postharvest Biology and Technology*, 29, 183-194. [https://doi.org/10.1016/S0925-5214\(02\)00248-X](https://doi.org/10.1016/S0925-5214(02)00248-X)
33. Meighani, H., Ghasemnezhad, M., & Bakhshi, D. (2015). Effect of different coatings on post-harvest quality and bioactive compounds of pomegranate (*Putnica granatum* L.) fruits. *Journal of Food Science and Technology*, 52(7), 4507-4514. <https://doi.org/10.1007/s13197-014-1484-6>
34. Montero-Prado, P., Rodriguez-Lafuente, A., & Nerin, C. (2011). Active label-based packaging to extend the shelf-life of "Calanda" peach fruit: Changes in fruit quality and enzymatic activity. *Postharvest Biology and Technology*, 60, 211-219. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2011.01.008>
35. Moraes, K.S., de Fagundes, C., Melo, M.C., Andreani, P., & Monteiro, A.R. (2012). Con-servation of Williams pear using edible coating with alginate and carrageenan. *Ciencia e Tecnologia de Alimentos*, 32, 679-684. [http://dx.doi.org/10.1016/S0963-9969\(00\)00093-4](http://dx.doi.org/10.1016/S0963-9969(00)00093-4)
36. Mozafari, A.A., Dedejani, S., & Ghaderi, N. (2018). Positive responses of strawberry (*Fragaria ananassa* Duch.) explants to salicylic and iron nanoparticle application under salinity conditions. *Plant Cell Tissue Organ Culture*, 134, 267-275. <https://doi.org/10.1007/s11240-018-1420-y>
37. Nair, M.S., Tomar, M., Punia, S., Kukula-Koch, W., & Kumar, M. (2020) Enhancing the functionality of chitosan- and alginate-based active edible coatings/films for the preservation of fruits and vegetables: A review. *International Journal of Biological Macromolecules*, 320. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.083>
38. Nemzer, B., Vargas, L., Xia, X., & Feng, H. (2018). Phytochemical and physical properties of blueberries, tart cherries, strawberries, and cranberries as affected by different drying methods. *Food Chemistry*, 262, 242-250. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.04.047>
39. Nia, A.E., Taghipour, S., & Siahmansour, S. (2021). Pre-harvest application of chitosan and postharvest Aloe vera gel coating enhances quality of table grape (*Vitis vinifera* L. cv. 'Yaghouti') during postharvest period. *Food Chemistry*, 347, 129012. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129012>
40. Nia, A.E., Malekzadeh, E., Taghipour, S., Tatari, A., Arshad, Z.G. (2023). Effects of preharvest chitosan-Myrtus communis essential oil composite and postharvest nanocellulose on quality of strawberry. *International Journal of Biological Macromolecules*, 253, 126733. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.126733>.

41. Peretto, G., Du, W.X., Avena-Bustillos, R.J., Sarreal, S.B.L., Hua, S.S.T., Sambo, P., & McHugh, T.H. (2014). Increasing strawberry shelf-life with carvacrol and methyl cinnamate antimicrobial vapors released from edible films. *Postharvest Biology and Technology*, 89, 11-18. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.11.003>
42. Romanazzi, G., Feliziani, E., Sivakumar, D., & Chitosan, A. (2018). Biopolymer with triple action on postharvest decay of fruit and vegetables: eliciting, antimicrobial and film-forming properties. *Front. Microbiology*, 9, 2745. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02745>
43. Rostamzadeh, B., Ramin, A.A., Amini, F., & Pirmoradian, M. (2015). Effect of chitosan coating on increasing postharvest life and maintaining apple fruit quality Cv "Soltani". *JCPP*, 5(17), 263-272.
44. Saki, M., ValizadehKaji, B., Abbasifar, A., & Shahrjerdi, I. (2019). Effect of chitosan coating combined with thymol essential oil on physicochemical and qualitative properties of fresh fig (*Ficus carica* L.) fruit during cold storage. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 13(2), 1147-1158. <https://doi.org/10.1007/s11694-019-00030-w>
45. Shin, Y., Liu, R.H., Nock, J., Holliday, D., & Watkins, C.B. (2007). Temperature and relative humidity effects on quality, total ascorbic acid, phenolics and flavonoid concentrations, and antioxidant activity of strawberry. *Postharvest Biology and Technology*, 45, 349-357. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2007.03.007>
46. Shirzad, H. (2013). Effect of chitosan and calcium chloride to reduce postharvest rot and different quality attributes on Siah mashhad sweetcherry. *Journal of Horticultural Science*, 26(4), 378-384. <https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18224>
47. Srinivasa, P.C., Baskaran, R., Armes, M.N., Harish Prashanth, K.V., & Tharanathan, R.N. (2002). Storage studies of mango packed using biodegradable chitosan. *Food Research and Technology*, 215, 504-508. <https://doi.org/10.1007/s00217-002-0591-1>
48. Tanada-Palmu, P., & Grosso, C. (2005). Effect of edible wheat gluten-based films an coatings on refrigerated strawberry (*Fragaria ananassa*) quality. *Postharvest Biology and Technology*, 36, 199-208. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2004.12.003>
49. Tzortzakis, N., Xylia, P., & Chrysargyris, A. (2019). Sage essential oil improves the effectiveness of *Aloe vera* gel on postharvest quality of tomato fruit. *Agronomy*, 9, 635. <https://doi.org/10.3390/agronomy9100635>
50. Yuan, G., Chen, X., & Li, D. (2016). Chitosan films and coatings containing essential oils: The antioxidant and antimicrobial activity, and application in food systems. *Food Research International*, 89, 117-128. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2016.10.004>
51. Ziv, C., & Fallik, E. (2021). Postharvest storage techniques and quality evaluation of fruits and vegetables for reducing food loss. *Agronomy*, 11, 1133. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061133>
52. Zivanovic, S., Shuang, C., & Draughon, A.F. (2005). Antimicrobial activity of chitosan films enriched with essential oils. *Food Science*, 70, 45-51. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2005.tb09045.x>